









KRITISCHE REVISION

DER

INSEKTENFAUNE

DEUTSCHLANDS

NACH DEM SYSTEM BEARBEITET

VON

Dr. GEORG WOLFG. FRANZ PANZER.

---

I — XCVI. HEFT.

---

I. BAENDCHEN.

---

N Ü R N B E R G,

in der Felfseckerschen Buchhandlung

1805.



Chas. W. Richmond.  
Apr. 11, 1904.





## V o r b e r i c h t.



Obgleich die deutsche Insektenfaune, seit ihrer Gründung, mit und bey der Angabe, der von ihr vorgestellten und genannten Insektenarten, sich mit bekannter, und vielleicht nur selten verfehlter Genauigkeit, an das schon vor ihrer Gründung, von den meisten Entomologen angenommene System anzuschließen erlauben konnte, so war sie doch hiebey eben so wohl, als

## V o r b e r i c h t.

dasselbe selbst, der Natur der Sache nach, einer bis izt noch fortdauernden und vielleicht nie sich endenden Umstaltung, und durch die neuern Entdeckungen, und wiederholten genauern Beobachtungen nothwendig gewordenen Abänderung ihrer nomenclatorischen Angaben, und systematischen Befolgungen unterworfen. In so ferne es nur immer möglich war, sich von den genauern Bestimmungen, welche sowohl in den neuern Fabrizzischen Werken, als in denen, anderer vorzüglicher Entomologen an die Hand gegeben wurden, leiten zu lassen, als auch selbst dadurch, was aus eigenen wiederholten, und genauer als vorhin angestellten Untersuchungen resultirte,

habe

## V o r b e r i c h t.

habe ich als Herausgeber, so weit es meine übrigen Berufsverhältnisse verstatteten, nicht nur mit besonderer Vorliebe, sondern auch mit möglichster Sorgfalt, das wohl größtentheils benützt und angenommen, was meinem Werke einen höhern Grad von Bestimmtheit und Zuverlässigkeit bey der Angabe, der darinn vorgestellten Gegenstände gewähren konnte. Es war dieses mein Bestreben stets, und wenn ich auch nicht der Meinung, oder den vielleicht strengen Wünschen aller genügen konnte, so lag wohl der Grund vorzüglich darinn, daß ich der Fabrizischen Nomenclatur am meisten getreu geblieben, und nicht solche da schon hintansetzte, wo ich ahnden konnte, daß der ehrwürdige Fabrizius entweder

der

## V o r b e r i c h t.

der von selbst diesen oder ienen Gegenstand, eben also beurtheilen und bestimmen, oder wenigstens, wie die Folge auch wirklich lehrte — diese andere, vielleicht besser gewählte Bestimmung annehmlich finden dürfte. Konnte indessen manche richtigere und zweckmäsige nachher aufgefundenene Bestimmung, während dem Vorrücken der einzelnen Hefte auf die vorhergehenden nicht mehr zurückwürken, so suchte ich solche doch bey der zweiten Auflage der frühern Hefte anwendbar zu machen, Da jedoch diese zweite Auflage nur sehr langsam vorrücken kan, und selbst die ersten Hefte dieser selbst, so wie die spätern der erstern, so manche Vorstellungen enthalten, welche

eine

## Vorbericht.

eine seitdem nothwendig gewordene Berichtigung ihrer nomenclatorischen Angaben heischen, auch manche Freunde und Besitzer der deutschen Insektenfaune sehr wünschten, mit solchen früher bekannt zu werden, als ausserdem kaum etwa möglich war, so konnte ich wohl nicht, mich gegenwärtig schon, während dem ununterbrochenen Fortschreiten derselben, einer kritischen Revision der abgebildeten und solche heischenden überheben, zumal in der Voraussetzung, hiedurch die Brauchbarkeit derselben gewinnen zu lassen. Ob ich gleich bey der Berichtigung mancher nomenclatorischen Angaben zuvörderst von den neuesten Fabrizeschen,

## V o r b e r i c h t.

schen Werken ausgieng, in so ferne in solchen auf die von mir abgebildeten Gegenstände, mit Zuverlässigkeit hingewiesen worden, so hielt ich es doch auch für Pflicht, auch auf andere entomologische Werke, in welchen auch diejenigen Arten, die ich in der deutschen Infektenfaune vorstellig gemacht habe, noch näher und noch richtiger beistimmt worden sind, die gebührende Rücksicht zu nehmen. Eben so wohl habe ich dankbar diejenigen Erinnerungen, Nachweisungen und Kritiken zu benützen keinen Anstand nehmen können, welche in den mir bekannten vorzüglichern kritischen Zeitschriften, unter welchen ich die meist sehr pertinenten Erinnerungen

gen

## Vorbericht.

gen des achtungswürdigen Recensenten in der Allgem. Lit. Zeit. nennen kan, mir vorgekommen sind. Doch würde ich vielleicht kaum das haben leisten können, was ich glaube wirklich geleistet zu haben, wenn nicht einer der scharfsinnigsten, und mit allem Rechte hochgeachteten deutschen Entomologen, Herr D. Illiger in Braunschweig, die Güte und Freundschaft für mich gehabt hätte, die von mir ihm vorgelegten Fragen, Anstände und Zweifel, über mehrere in der deutschen Infektenfaune abgebildeten Arten, zu beantworten, und zu beseitigen. Herr D. Illiger muß unstreitig hiebey darum als kompetenter Richter anerkannt werden, weil er nur  
allein

## V o r b e r i c h t.

allein in Stand seyn konnte, mir über mehrere Insektenarten, die mir mein verehrungswürdiger Freund, Herr Hofrath Dr. Hellwig in Braunschweig, aus seinem reichen Cabinete zur Bekanntmachung erlaubte, zumal über dieienigen, welche in der Insektenfaune bisher nur allein, ohne alle Concurrenz zur Sprache gebracht worden, die ich nun nimmer selbst vergleichen konnte, eine in aller Hinsicht genügende Auskunft zu geben. Mit dem verbindlichsten Dank erkenne ich hier öffentlich diese vorzügliche Beyhülfe, von der ich auch, wie durchaus ersichtlich ist, mit der größten Genauigkeit, einen solchen Gebrauch gemacht habe, der iedem, der für diese

Gegen-



## V o r b e r i c h t.

Gegenstände einiges Interesse hat, gewis nicht anders, als höchst willkommen seyn wird,

Doch glaubte ich, daß es auch mir erlaubt seyn würde, über dieienigen Arten, welche ich etwas anderst, als andere, nicht minder darum von mir geschätzte Entomologen, beobachtet, meine Meinung zu sagen: man wird ausserdem auch bemerken, daß ich ieder gerechten Kritik, sie komme her, von wem sie wolle, offen und gerade die ihr gebührende Gerechtigkeit wiederfahren liefs, wenn ich gleich im Gegentheil manche unstatthafte Zurechtweisung von mir ablehnen mußte: ein Umstand, den ich mir eben so zuständig

stets

## V o r b e r i c h t.

stets erachten werde, als ich andern die unbedingte Freyheit zugestehe, mir es geradezu anzuzeigen, wenn ich etwa einer Bestimmung gehuldigt hätte, die sich mit der naturhistorischen Wahrheit und Erfahrung, nicht vertragen sollte. Ausserdem wird man noch finden, dafs ich in dieser kritischen Revifion, nur alleine diejenigen, von mir in der deutschen Insektenfaune vorgestellten Arten genannt habe, bey welcher ich eine Berichtigung für nöthig erachtete, dagegen alle andere, für berichtigt angenommen, übergangen habe. Möglich ist es indessen doch, dafs unter solchen von mir nicht ausdrücklich genannten, noch manche sind, die einer nähern

## V o r b e r i c h t.

nähern Erläuterung und Berichtigung bedürfen. Mit verbindlichem Danke würde ich es erkennen, wenn diejenigen einsichtsvollen Entomologen, welche dieses erste Bändchen, etwa zeitig in den gelehrten Zeitschriften beurtheilen werden, mich selbst hierauf aufmerksam zu machen die Güte haben wollten, um bey dem Schlusse des ganzen, diese, und noch einige andere Arten, die während dem Abdruck dieses ersten Bändchens mir einer nähern Berichtigung unterwürffig schienen, anzufügen. In den beyden folgenden Bändchen, werde ich die übrigen in der Insektenfaune vorgestellten Arten, ie nachdem solche einer kritischen Revi-

sion

## V o r b e r i c h t.


sion heischen, nach dem System, anzuzeigen und vorzulegen, zugleich auch das nöthige Register über diese 96 Hefte, anzuschließen, gewis nicht verfehlen.

Geschrieben Nürnberg den 11. April

1 8 0 5.

Dr. Panzer.

I. ELEUTHERATA FABRIC.



---

CLASSIS I.  
ELEUTHERATA FABRIC.

---

GEOTRUPES NASICORNIS Faun. Inf. ger. XXVIII.  
2. ed. II.

*Geotrupes nasicornis*, Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 41. p. 13.

Eine weniger bekannte Abbildung dieses Käfers, kommt in der vielleicht eben so wenig allgemein bekannten kleinen Schrift: *Observationes circa humani corporis Teredinem, a Ioh. Cosmo Bonomo ad Francisc. Redum &c. italico sermone 1687 conscriptae et Florentiae typis impressae, nunc vero latinitate donatae a Iosepho Lanzono. 4. Liburni 1687*, auf der hiezu gehörigen Kupfertafel (welche unten mit Dec. II. bezeichnet ist) bey Fig. 8. vor. Auf pag. 8. wird desselben Käfers, aber zugleich mit Begehung eines sehr starken Irrthums also gedacht: *VII. Figura exprimitur vermis sive caries (die Larve dieses Geotr. nasic. F.) quae postea in Scarab. pillularium (den Ateuchus facer) et in scarabaeum stercorarium (diesen Geotrup. nasic. F.) transformatur. Quemadmodum figura VIII. ipse stercorarius repraesentatur Scarabaeus (sehr kenntlich dieser G. nasic.) ac Fig. IX. pillularius (eben so kenntlich der Ateuchus facer) itidem insculpitur scarabaeus,*

A

SCAR

**SCARABAEVS QVADRIDENS** Fn. Inf. germ. XIII. 1.

*Scarabaeus Aeneas*. Panzer Beytr. p. 34. tab. 5.

Fig. 1 — 4.

*Scarabaeus unicornu*, Schrank. Naturf. XXIV,

n. 2. p. 61.

*Scarabaeus quadridens*. Fabric. Syst. Eleuth. I.

n. 6. p. 23.

Herr Prof. Fabricius führt nicht nur die in meinen Beyträgen etc. a. a. O. befindliche Figur dieses Käfers bey seinem *Scarabaeus quadridens* l. c. an, er erhielt auch ein Exemplar dieses nehmlichen Käfers von mir, und äufsert sich darauf sehr bestimmt, *dafs derselbe sein Scarabaeus quadridens wirklich seye!!* Vergleiche hierüber Illiger Mag. I. p. 312, wofelbst behauptet wird, dafs dieser *S. quadridens* Fn. und *S. Aeneas*, nicht der *S. quadridens* Fabric. sey: wie auch A. L. Z. 1803. Nr. 353. p. 620.

**SCARABAEVS STERCORARIVS**. Faun. Inf. germ. XLIX. 1.

Sturm. ent. Handb. I. n. 57. p. 63. Tab. II.

Fig. A — S.

Walkenaer Faun. parif. I. n. 2. p. 3. Tab. II.

fig. 2. A—Q. (Ein blofser Nachstich der vorhergehenden Zeichnungen.)

**SCARABAEVS SYLVATICVS**, Fn, Inf, germ, XLIX. 3.

*Sca-*



*Scarabaeus sylvaticus*, Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 11. p. 25.

Illiger Kugelnms Käfer Preuffens I. n. 3. p. 9.

SCARABAEUS VERNALIS Fn. Inf. germ. XLIX. 2.

Schäffer Sc. Inf. ratisb. tab. 222. fig. 1. ge-  
hört mit mehr Recht hieher, als zu dem *Sc.*  
*sylvatic*. F.

SCARABAEUS TESTACEUS Fn. inf. germ. XXVIII. 5.

Ist nichts anders als eine *Abänderung* des weib-  
lichen *Scarab. mobilicorn*. Fab. Ich bitte hiebey  
nachzulesen, was ich in meinen *Beyträgen &c.* S. 82.  
u. f., so wohl über diesen *S. testaceus*, als *licht-*  
*braune Abänderung*, als auch über die generische  
Dignität des *Sc. mobilicornis* Fab. überhaupt, er-  
wähnt habe. Hieher gehört auch:

Schäffer. Icon. Insect. ratisb. tab. 151. fig. 4.  
Fem. variet.

Panzer systemat. Nomenclat. d. Schöff; Inf.  
n. 4. p. 143.

Vergl. *Allgem. Lit. Zeit.* 1797. Nr. 143. p. 324.

SCARABAEUS LUNARIS. Fn. inf. germ. XLIX. 4;

*Copris lunaris*, Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 29.  
p. 36.

Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 1. p. 39.

Sturm ent. Handb. I. n. 74. p. 87. tab. IV.  
fig. A—R.

SCARABAEUS EMARGINATUS. Fn. inf. germ.  
XLIX. 5.

*Copris emarginata*. Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 30. p. 37.

Gewis nur eine zufällige *Abänderung* des vorhergehenden. Ich finde sie beide jährlich in Gesellschaft an ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsorte beyeinander. — Schäff. I. Inf. ratisb. tab. 63. fig. 2. stellt das *Weibchen* der *C. lunaris* vor.

SCARABAEVS VACCA. Fn. inf. germ. XII. 4. Femina.

*Copris Vacca*. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 70.  
p. 45.

Schäffer Ic. Inf. ratisb. tab. 73. fig. 2. 3.

Illiger Kug. K. Pr. I. n. 3. p. 40.

Panzer Beytr. p. 101. tab. 11. fig. 1. 2. 3. 4.

SCARABAEVS MEDIVS. Fn. Inf. ger. XXXVII. 4.

*Copris media*. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 71.  
p. 46.

Creutzer Versuch. n. 19. p. 62.

Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 4. p. 41.

SCARABAEVS CAPRA. Fn. inf. germ. XLIX. 7.

*Copris capra*. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 72.  
p. 46.

*Copris Taurus* var.  $\beta$ . Illiger Kug. Käf. Pr. I.  
n. 8. p. 44.

Die Kürze und Geradheit der beiden hörnerartigen spitzigen Fortsätze des Kopfschildes hat

ver-

verschiedene einsichtsvolle Entomolgen verleitet; hierin nur einen Uebergang der Copr. Taurus zu dieser zu bemerken. Man vergleiche indessen *Creutzer* in Verf. S. 72. n. 25. Was daselbst hierüber gesagt wird, kan ich nach meiner Ansicht nur bestättigen. Hiebey stimmt auch *Sturm* ent. Handb. I. p. 94. mit ein, wiewohl dieses Herrn D. *Illiger* (S. dessen Magaz. I. S. 35.) noch nicht überzeugt.

SCARABAEUS NUCHICORNIS. Fn. inf. germ. IV. 1.

*Copris nuchicornis*. Fabric. Syft. Eleuth. I.

n. 90. p. 50.

In Herrn D. *Illigers* Magaz. I. p. 32. n. 5. a. muß diese bey *Copris fracticornis* citirte Figur der *Fn. inf.* wegfallen, da ich hier ganz unstreitig die *Copris nuchicornis* vorgestellt habe; auch wollte Herr *Creutzer* Verf. p. 64. ia wohl nicht fagen, das meine Copr. nuchicor. und fracticornis — nur eine und eben dieselbe Art wären. Das konnte er auch nicht!

SCARABAEUS FRACTICORNIS. Fn. inf. ger. XLIX. 9.

*Copris fracticornis*. Fabric. Syft. Eleuth. I.

n. 91. p. 50.

*Scarab. nuchicornis*. Payk. Fn. Suec. I. n. 38.

p. 31.

*Creutzer* Verf. p. 64.

*Illiger*

Illiger Magaz. I. n. 5. a. p. 32.

Die von mir angeführten Schäfferfchen Figuren fallen weg.

SCARABAEVS XIPHIAS. Fn. Inf. germ. XLIX. 8.

*Copris Xiphias*, Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 92, p. 50.

Nur eine Abänderung der *Cop. nuchicornis*, nach Illigers und Creutzers richtiger Bemerkung.

SCARABAEVS HYBNERI. Fn. Inf. germ. LXVII. 5.

*Copris Hybneri*, Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 107, p. 53.

Ist nur das *Männchen*, wozu *Cop. Alces* als das *Weibchen* gehört. Vergl. Illig. Mag. III. p. 149.

SCARABAEVS AVSTRIACVS. Fn. Inf. germ. XII. 6.

*Copris austriaca*, Sturm. ent. Handb. I. n. 88, p. 103.

Schäffer Ic. Inf. ratisb. tab. 73. fig. 4. 5. et tab. 96. fig. 1.

Panzer System. nomenclat. d. Schöff. Inf. n. 4. 5. p. 89. n. 1. p. 107.

Ganz sicher gehören diese Schäfferfchen Figuren hieher, wie auch ich mich aus den Schäfferfchen Originalmahlereyen überzeugt habe. Diese Art ist außerdem durch den Umriss des Kopfes und des Brustflückes von *Copr. fracticornis* Fabr. standhaft verschieden.

SCARABAEVS SEMICORNIS Fh. Inf. germ. LVIII. 10.

Bey der Anzeige der auf dieser Kupfertafel vorkommenden Figuren, ist noch nachzuholen, das fig. c. den clypeum antice visum cum corniculo truncato magnitudine auctum, dieser nun unbezweifelt unter *Copris* eigenen selbstständigen Art, vorstelle. Herr D. Illiger äußerte sich in einem Schreiben an mich, über diese *Copris semicornis* Faun. inf. g. mit folgenden. „Ist eine „deutlich verschiedene Art, die wir zweymal „aus den französischen Rheindepartements, und „einmal aus Moskau erhalten haben. Letztere „stimmt genau mit der Abbildung überein. Das „eine Rheinische aber hat ein höheres am Ende „tiefer ausgebuchtes Kopfblech, dessen hintere „Seite, so wie der flach hohle Hinterkopf ge- „glättet ist; und die vordern Halschildserhöhun- „gen sind spitz. Das andere (♀?) hat vor dem „Hinterkopfe bloß eine scharf erhöhte einfache „Querleiste, die hinterwärts sich in den flachen „Hinterkopf verflächt. Wir hatten diese *Copris* „sonst *bicuspis* genannt.“

SCARABAEVS SACER. Fh. Inf. germ. XLVIII. 7.

*Ateuchus sacer*. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 1.  
p. 54.

Panzer Beytr. I. p. 56. tab. 6. fig. 3. 4. 5.

Leider

Leider hat auch diese von mir veranstaltete Figur, so wie jene ältere in meinen Beyträgen an den Vorderfüßen, die Tarfen — welche sie, wie ich mich nun wohl, an mehreren seitdem genau beobachteten Exemplaren, aus verschiedenen Gegenden, überzeugt habe, in rerum natura nicht hat. Dagegen ist die in der oben (bey Geotrup. nasc.) angeführten kleinen Schrift des *Bonomo*, befindliche, bey Fig. IX. vorkommende Figur dieses Sacer, desto richtiger vorgestellt, — denn diese hat keine Tarfen an den Vorderfüßen. Leicht läßt sich indessen dieser Irrthum erklären, da so wohl ich als die Künstler mangelhafte Exemplare (in dieser Hinsicht) vor sich zu haben, wähten.

Auf der zur *Fn. Inf* gehörigen Kupfertafel, ist wie Herr D. *Illiger* gegen mich sehr richtig erinnert, der südeuropäische Linnische sacer, mit den beyden tuberculis clypei vorgestellt, nicht aber der in Ungerns Grenzgegenden vorkommende, den Herr D. *Illiger* pius zu nennen geneigt ist. Nur bitte ich hiebey nachzulesen, was ich bey Beschreib. des sacers in meinen Beytr. a. a. O. erinnert habe. Mir sind wohl auch Exemplare von dieser abweichenden Beschaffenheit bekannt: aber ob *deshalb* auf eine Artverschiedenheit geschlossen werden könne? — das ist doch immer noch nicht entschieden. Vergl. hiemit *Illiger*  
 Mag.

Mag. II. n. 1. p. 202. und A. L. Z. 1803. Nr. 353.  
p. 620.

SCARABAEVS SCHREBERI. Fn. Inf. germ. XXVIII.

14.

*Ateuchus Schreberi*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 32. p. 61.

Ich mögte nun wohl selbst anrathen, *Voet*  
tab. 28. f. 49. bey dieser Art wegzulassen, um so  
mehr, da nach *Illigers* Nachweisung aus *Olivier*  
(Käf. Pr. I. n. 9. p. 45.) es sehr wahrscheinlich  
ist, das *Voet* eher *Oliviers* Scar. quadrigutt. ge-  
meint haben könne, als den unfrigen. — Richtig  
genug erwähnt auch *Illiger*, das dieser *Schreberi*,  
eher unter die *Coprides* als *Ateuchos* gebracht wer-  
den müsse. Magaz. I. p. 319.

SCARABAEVS FLAVIPES. Fn. Inf. germ. XLVIII.

10.

*Ateuchus flavipes*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 39. p. 63.

Nach Herrn *Illiger* eine *Onitis*. Mag. I. p. 319.

SCARABAEVS GEOFFROYAE. Fn. Inf. germ. XLIX.

10.

*Ateuchus pilularius*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 27. p. 60. (excluso ibid. Syn. Linn.)

*Gymnopleurus cantharus*. Illiger Magaz. II.  
n. 2. p. 201.

Ich

Ich will sehr gerne zugeben, daß *Geoffroyi* richtiger geschrieben als *Geoffroyae* sey. Nur irren die Herren *Creutzer* und *Illiger* sehr, wenn sie behaupten, ich sey es gewesen, der dies unrichtige *Geoffroyae* gebildet oder angegeben habe. *Fuesly*, *Sulzer*, *Scriba*, *Göze*, *Harrer* — schrieben lange *vor mir* *GEOFFROYAE!!*

SCARABAEVS FOETENS. Fn. Inf. germ. XLVIII. 1.  
*Aphodius foetens*. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 8.  
p. 69.

Ueber die Identität dieser Art verdient nachgelesen zu werden *Creutzer* Verf. n. 13. p. 46.

SCARABAEVS SCYBALARIVS. Faun. Inf. germ.  
XLVII. 1.

*Aphodius scybalarius*. Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 10. p. 70.

Hierher gehört auch:

*Scarabaeus fimetarius*. Linn. Syft. nat. n. 32.  
p. 584. var.  $\beta$ .

*Herbst* Nat. d. Käf. II. n. 87. p. 133. tab. 12.  
fig. 2. 7.

SCARABAEVS STICTICVS. Fn. Inf. germ. LVIII. 4.

*Aphodius prodromus*. Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 11. p. 70.

*Aphodius sticticus*. *Creutz*. Verf. n. 7. p. 26.

Hie-



Hieher gehöret auch:

*Scarabaeus nemoralis*. Fn. Inf. germ. LXVII. 1.

Man vergleiche hiemit *Creutzer* Verf. p. 139.  
und *Illig.* Mag. III. p. 150.

SCARABAEVS ANACHORETA. Fn. Inf. germ. XXXV.  
(nicht XXXVI.) 1.

*Aphodius porcus*. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 16.  
p. 71.

*Illiger* Kugel. Käf. Pr. I. n. 22. p. 31.

SCARABAEVS BIMACULATUS. Faun. Inf. germ.  
XLIII. 2.

*Aphodius bimaculatus*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 17. p. 71.

Hiemit vergleiche man:

*Illiger* Kug. Käf. Pr. I. n. 13. p. 24. u. dessen  
Mag. I. p. 20. u. 22. u. p. 321.

Von dem *Aphod. terrestris*, wenigstens von dem,  
der in der Fn. Inf. germ. XLVII. 3. abgebildet  
worden, ist dieser *Aphod. bimaculatus* gewis keine  
Spielart. Mein *Aphod. terrestris* hat gegen die Spi-  
tze der Flügeldecken zu, diese mehr gewölbt, da  
solche bey meinem *Aph. bimacul.* dagegen um vie-  
les flächer sind, auch sind die crenae in den  
striis bey dem *A. bimacul.* viel stärker; nicht  
minder ist der hintere Rand des Bruststückes bey  
dem

dem *A. terrestris*, deutlich gerandet, der es bey dem *A. bimacul.* nicht ist.

APHODIUS SUBTERRANEUS. Faun. Inf. germ.  
XXVIII. 3. ed. II.

Bey dieser Art sind die *striae elytror.* allerdings *crenatae*, aber nicht so in dieser Abbildung. Ich habe dieses bey der Revision der Sturmischen Mahlerey übersehen, und bemerke dagegen, das demohngeachtet der wahre *Aphod. subterr.* hier gemeint ist.

SCARABAEUS CONFLAGRATUS. Faun. Inf. germ.  
XLVII. 2.

*Aphodius conflagratus.* Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 20. p. 72.

*Varietatem A. scybalarii* putat Illiger, an merito? fragt Fabricius a. a. O.; und nur bejahend kan diese Frage beantwortet werden.

SCARABAEUS CONSPURCATUS. Faun. Inf. germ.  
XLVII. 5.

*Aphodius conspurcatus.* Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 22. p. 73.

Man lese hierüber nach:

Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 15. p. 25. dann

Creutz. Verf. n. 5. p. 21. und

Illiger Mag. I. n. 15. b. p. 24 u. 25.

nur

nur fällt bey letztern das Citat, *Sc. nubilus Fn.*  
*Inf. germ. LVIII. 3.* hinweg.

**APHODIUS INQVINATUS.** Faun. Inf. germ. XXVIII.  
7. ed. II.

Creutz. Verf. I. n. 6. p. 24.

Hierher gehört mit mehr Recht, als zum vorhergehenden:

*Scarabaeus nubilus. Fn. Inf. germ. LVIII. 3.*

**SCARABAEUS SORDIDUS.** Fn. Inf. germ. XLVIII. 2.

*Aphodius sordidus.* Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 26. p. 74.

Creutzer Verf. n. 14. p. 49.

**SCARABAEUS VESPERTINUS.** Faun. Inf. germ.  
LXVII. 3.

*Aphodius Anachoreta.* Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 28. p. 74.

*Aphodius lividus.* Creutz. Verf. n. 12. p. 44.  
tab. I. fig. 7. a.

Nach Herrn *Creutzers* Vorgange, würde auch ich die lichtere Farbe der Flügeldecken, als die Grundfarbe derselben ansehen: *Fabrizius* hat das Gegentheil gewählt.

**SCARABAEUS GRANARIUS.** Fn. Inf. germ. XLIII. 3.

*Aphodius granarius.* Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 29. p. 75.

Die von mir ebenfalls gebrauchten *Linn.* und *Herbst.* Citata fallen weg, dafür gehört hierher:

*Apho.*

*Aphodius granarius*. Illiger Kug. Käf. Pr. I.  
n. 11. p. 22.

Vergleiche damit *Illigers* Mag. I. p. 22. und  
p. 322.

*Aphodius pusillus*. Faun. Inf. germ. XLIX. 11.  
als die Abänderung mit braunrothen Flügel-  
decken.

Dagegen fällt ferner weg: *Schäffer ic. inf. va-*  
*risb. tab. 144. fig. 5. 6.*

Vergleiche damit, meine *system. Nomenclat. der*  
*Schäfferfch. Insekt.* p. 139.

so wie bey *Illiger* Mag. I. p. 22. *Scarab. tristis*  
Faun. Inf. germ. LXXIII. 1. als eine eigene  
für sich bleibende Art, hinwegfallen muß.

Jedoch scheint aller Wahrscheinlichkeit nach  
*Scarab. sanguinolentus*. Fn. Inf. germ. XLIII. 4.  
nach Herrn Sturms Versicherung (dessen  
Handb. I. p. 94.) als zufällige Abänderung  
hierher zu gehören.

*APHODIUS NITIDULVS*. Fn. Inf. germ. XCI. 2.

Ich kan nun allerdings die frühere Vermuthung  
des Herrn *Creutzers* (Verf. p. 43. u. 56.) das:

*Scarab. merdarius*. Fn. Inf. germ. XLVIII. 3.  
(exclusa omni Synonymia)

so wie es mich nun selbst, ein genau angestellter  
Vergleich mit dessen *A. icterico* a. a. O. lehrte,  
gewis nichts anders ist, als dessen *A. ictericus*  
oder

oder dieser *A. nitidul.* Fabr. selbst, ia nicht einmal Abänderung: nur ist bey Zeichnung desselben, der dunkelbraun schattirte clypeus übersehen, und die Flügeldeckennaht übertrieben breit, schwarz, angegeben worden. Demnach ist dieser *Sc. merdar.* Faun. l. c. auf keinerley Weise, mit dem ungleich gröfsern *Aph. fordidus*, wie Herr D. Illiger an mich schriftlich erwähnte, in Verbindung zu bringen.

SCARABAEVS LVRIDVS. Fn. Inf. germ. XLVII. 6.

*Aphodius luridus.* Fabric. Syst. Eleuth. I.

n. 37. p. 76.

Nachgelesen zu werden verdient im hohen Betrachte, was Herr D. Illiger Mag. I. p. 323. über das *forte generatione hybrida orta?* Fabr. l. c. commentirt hat. Außerdem leidet es nach so manchen Bestättigungen keinen Zweifel mehr, das dieser *A. luridus* nur Spielart des *A. nigripes* F. feye.

SCARABAEVS RVFIPES. Fn. Inf. germ. XLVII. 10.

*Aphod. rufipes.* Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 35.

p. 76.

Vergleiche über das Linne'sche Citat, *Scarab. rufip.* Linn welches nun hierher gehört: Illig. Mag. III. p. 150.

**SCARABAEVS CONTAMINATVS.** Faun. Inf. germ.  
XLVII. 7.

Die in der Fn. Inf. a. a. O. gebrauchten Citata des *Fabrizius* und *Herbst* fallen hinweg: dagegen gehören folgende hieher:

*Scarabaeus tessulatus.* Paykull, Fn. Suec. I. n. 24.  
p. 20.

*Aphodius tessulatus.* Creutz. Verf. n. 8. p. 29.  
Vergleiche hiemit *Illiger* M. I. p. 321. n. 23.

**SCARABAEVS SPHACELLATVS.** Faun. Inf. germ.  
LVIII. 5.

*Aphodius consputus.* Fabric. Syft. Eleuth. T. I.  
n. 40. p. 77. (excluso Synonym. *Creutz.*)

*Aphodius prodromus.* Creutz. Verf. I. n. 10.  
p. 37.

*Aphodius prodromus.* Illiger Mag. I. n. 16. b.  
p. 26. u. p. 324.

Es kan seyn, das *Aphodius contaminat.* Fabr. Syft. Eleuth. I. p. 39. als Abänderung hieher gehört — darum eben wollte ich solchen hier nicht anführen.

**SCARABAEVS LUTARIUS.** Fn. Inf. germ. XLVII.  
11.

*Scarabaeus lutarius.* Fabric. Ent. Syft. I.  
n. 112. p. 35.

*Apho-*

*Aphodius immundus*. Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 41. p. 77.

Illiger Mag. I. n. 17—18. p. 28. et p. 324.

APHODIUS ELEVATUS. Fn. Inf. germ. LXXXVII. 1.

*Aphodius elevatus*. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 46.  
p. 79.

Ich weis es nicht gewifs, ob diese feltene Art schon in Deutschland entdekt worden ist, da ihr *Fabrizius* die Provence als Vaterland zuschreibt. Dafs indessen diese Art, gewifs hier vorgestellt worden ist, dafür bürgt das Exemplar selbst, welches ich vom Hrn. Prof. *Fabrizius* erhalten habe.

SCARABAEVS QVISQVILIVS. Fn. Inf. germ. XLVIII.  
4. (exclusa omni synonymia).

*Aphodius merdarius*. Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 52. p. 80.

Folglich gehört die bey *Scarab. merdarius*. Faun. Inf. germ. XLVIII. 3. stehende Synonymie hieher, nicht aber die dazu gehörige Figur, die den *Aphodius ictericus* *Creutz.* zugehört.

SCARABAEVS SABULETI. Fn. Inf. germ. XXXVII. 3.

*Aphodius sabuleti*. Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 56. p. 81.

Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 7. p. 21.

SCARABÆUS PUSILLUS. Fn. Inf. germ. LVIII. 8.

*Aphodius arenarius*. Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 63. p. 82?

*Aphodius arenarius*. Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 10.  
p. 22.

*Sturm*. ent. Handb. n. 43. p. 50. tab. II. fig. v. V.

SCARABÆUS SCROFA. Fn. Inf. germ. XLVII. 12.

*Aphodius scrofa*. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 51.  
p. 80.

*Scarabæus minutus*. Herbst Nat. d. Käf. II.  
n. 163. p. 269. tab. 18. fig. 7.

Sehr zu beherzigen, und allerdings Aufmerksam-  
keit verdienend, ist dieicnige Bemerkung,  
welche *Creutzer* (Verf. n. 3. p. 18.) über diesen  
*Aphodius* hier mitgetheilt hat. Es ist noch izt  
nicht gewis entschieden, welchen *Aphodius* Herr  
Prof. *Fabriz.* unter seinem *arenarius* gemeint ha-  
be. So viel ist aber gewis richtig, dafs *Paykulls*  
*Scarab. arenarius* Fn. Suec. I. n. 33. p. 27. nicht zu  
diesem *pusillus* Fn. Inf. l. c. gehören kan, und  
dafs derselbe keine andere speciem bezeichnet,  
als den *Scarab. globosus* Fn. Inf. germ. XXXVII. 2.  
Dafür bürgt die *Paykullsche* sehr richtige, und  
diesem genau anpassende Befchr. a. a. O. Aber  
Herr Prof. *Fabrizius* scheint sich wirklich bey  
seinem *arenarius* confundirt zu haben. Nach An-  
gabe der *Ent. System.* habe er vom *Paykull* dessen

*Arena-*



*Arenarius* (infern *globosus*) erhalten, welcher Umstand doch nicht in dem Syft. Eleuth. wiederholt wird; und doch bringt er nun, (im Syft. Eleuth.) *eine Art* unter feinen *arenarius* die von dem *Paykullfchen aren.* ganz verſchieden iſt. So viel iſt richtig: Herr Prof. *Fabrizius* ſchickte mir einſt feinen *Scarab. elevatus* zu, und nachher eben denſelben; unter dem Namen *Scarab. arenarius*. Vergleiche man nun dieſen *elevatus* (Faun. LXXXVII. 1.) mit dem *Paykullfchen arenarius* (Faun. XXXVII. 2.) ſo wird man, bey all der wichtigen und groſſen Artverſchiedenheit, dennoch eine ſehr bedeutende Aehnlichkeit zwiſchen dieſen beiden unmöglich beſtreiten können. Es wäre alſo doch möglich, daß, nach dieſem Mißgrif zu ſchließen, *Fabrizius* anfangs den *Paykullfchen arenarius* für den ſeinigen erkannt, nachgehends aber ſeine Meinung geändert, und vielleicht nun dieſen *puſillus* als ſolchen aufgenommen habe.

Uebrigens gehört — nemlich als *puſillus* — *Herbſt* tab. 18. fig. 6. nicht aber tab. 12. fig. 12. hieher, welche letztere Figur (Faun. XLIX. 11.) einige unter *A. granar.* zu bringen geneigt ſind: wiewohl ich darum nicht ſicher entſcheiden kan, weil ich dieſes Exemplar, nach welchem die angelegte Zeichnung verfertigt worden, nicht mehr beſize, um ſolche gehörig zu vergleichen.

SCARABAEVS CAESVS. Fn. Inf. germ. XXXV. 2.  
*Aphodius caesus*. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 65.  
p. 82.

SCARABAEVS SEROTINVS. Fn. Inf. germ. LXVII. 2.  
*Aphodius serotinus*. Creutz. Verf. n. 18. p. 60.  
Tab. 1. fig. 11. 8.

SCARABAEVS TRISTIS. Fn. Inf. germ. LXXXIII. 1.  
Dieser *tristis* gehört als eine eigene Art unter  
die *Aphodien*.

SCARABAEVS NIGER. Fn. Inf. germ. XXXVII. 1.  
*Aphodius niger*. Illiger Kug. Käf. Pr. 1. n. 14.  
p. 24.  
Illiger Mag. I. p. 23.

SCARABAEVS GLOBOSVS. Fn. Inf. germ. XXXVII. 2.  
*Scarabaeus arenarius*. Paykull. Fn. Succ. I.  
n. 33. p. 27.  
*Scarabaeus arenarius*. Fabric. Syst. Eleuth.  
n. 130. p. 39.  
Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 6. p. 20.  
— Mag. I. p. 20.

Das vom *Fabrizius* hier angezogene *Geoffr. I.*  
*n. 29. p. 86.* gehört gewis nicht hieher: dies widerlegt schon das verschiedene Größenmaafs beider, wenn auch nicht die Beschreibung widersprüche. Stünde ersteres nicht im Weege, so würde ich eher *Geoffr.*, bey *Aphod. elevatus* als bey

bey unferm *globosus* anzuführen glauben. Herr D. Illiger schrieb mir über diesen folgendes: *eine sehr schön ausgezeichnete Art, von der ich hundert bey Calais gefangen, zum theil röthliche Stücke gesehen habe. Paykull nennt ihn Scarab. arenar. allein der Fabricius'sche (nehmlich Syst. Eleuth. feze ich hinzu) kann es nicht seyn.*

SCARABAEVS VARIEGATVS. Fn. Inf. germ. XLVII. 8.

Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 18. p. 28. var.  $\beta$ .

Gehört unbedenklich als *Abänderung*, elytris apice lurido striatis, unter *Aphodius nigripes Fabr.*

SCARABAEVS CENTROLINEATVS. Faun. Inf. germ.

LVIII. 1.

Vergleiche Creutz. Verf. I. n. 6. p. 24. wornach; woran auch ich nicht zweifle, dieser *centrolineatus* als *Abänderung* unter *Aphodius inquinatus* F. gebracht wird.

SCARABAEVS EQVESTRIS. Fn. Inf. germ. LVIII. 2.

Gleich unbedenklich ziehe ich nun mit *Creuzer* Versuch I. n. 7. p. 26. diesen *equestris*, zu dem *Scarab. sticticus*, oder zu *Aphodius prodromus Fabric.* als eine weniger geflekte *Abänderung*, bey der nur die Spitze des äußern Randes am Bruststücke schmal gelb gefäumt ist.

SCARABAEVS LIMICOLA. Fn. Inf. germ. LVIII. 6.

Gehört als Abänderung, so wie *Sc. vespertinus* Fn. Inf. germ. LXVII. 4, unter *Aphodius Anachoreta* Fabr. oder *Aphod. lividus* Creutz.

SCARABAEVS COENOSVS. Fn. Inf. germ. LVIII. 7.

Ist eine sehr problematische Art, die jedoch weder mit *granarius* noch *foetidus* vereinigt werden darf. Da ich solche nicht mehr besitze, so kan ich auch nicht angeben, wie es kam, daß diese Figur einen *dreyhöckerichten clypeus*, den ich doch nicht bemerkte, und das Bruststück keinen rothen Seitenrand hat, den ich derselben doch wohl nicht andichtete.

SCARABAEVS FORORIORVM. Fn. Inf. germ. LVIII. 9.

Herr D. Illiger schrieb mir hierüber: *stimmet mit einer aus Portugall gebracht-n Spielart des Aphod. merdar, Fabr. sehr gut überein*: nur kan ich Herrn Sturm, (Handb. p. 84.) nicht ganz unrecht geben, der diese Art, doch wohl nicht, wegen der von mir als ringsherum schwarz gefäunt beschriebenen Flügeldecken, alleine, als zweifelhaft, unter *Aph. merdarius* bringt. Auch diesen besitze ich nicht mehr.

HISTER UNICOLOR. Fn. Inf. germ. IV. 2.

*Hister cadaverinus*. Entom. Hefte. I. n. 2.  
p. 34.

HISTER

HISTER SINUATUS. Fn. Inf. germ. LXXX. 1.

*Hister cruciatus*. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 19.  
p. 87.

Hieher gehört, als eine von diesem *cruciatus* nicht wesentlich verschiedene Abart, der *Hist. lunatus Fabric.*, der bekanntlich mit dem *Hist. quadrimacul. Linn.* nur eine und eben dieselbe Art bestimmt. Man vergleiche hierbey:

*Entom. Hefte. I. n. 4. p. 41. und p. 121.*

Dagegen fällt die ehehin, *Fn. Inf. LXXXI. 1.* angeführte Synonymie (ausgenommen *Voet. Coleopt. tab. 31. fig. 3.*) hinweg, ingleichen das in den *Entom. Heften*, n. 5. p. 44. bey *H. sinuatus* angezogene Citat aus der *Fn. Inf.*

HISTER BIPVSTVLATUS. Fn. Inf. germ. LXXX. 3.

*Hister sinuatus*. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 17.  
p. 87.

*Hister fimetarius. Ent. Hefte I. n. 7. p. 48.*

Herr Dr. Illiger äußerte sich gegen mich schriftlich hierüber mit folgendem: *In den entomol. Heften p. 121. wird diese Behauptung zwar bestritten, allein ich habe mich von neuem überzeugt, daß Fabricius diesen Käfer, durch elytri macula media angulata rufa, nicht aber den H. sinuatus Käf. Pr., meynen konnte, wo der Flek nicht in der Mitte steht, und an der Schulter anfängt. Was Fabricius Vergleichung mit H. cruciatus betrifft, so wende ich dagegen ein, daß Fabricius Ver-*  
glei-

gleichungen, nicht allemal genau sind. — Die Verf. d. r entom. Hefte, werden bey wiederholtem Vergleich, und durch die gegenwärtige Bestimmung des *Hister cruciatus*, der nun den von mir eehin genannten *H. sinuatus* vorstellt, und den selbige mit Ihrem *Sinuatus*, (nehmlich dem *Fabric* und *Illiger*schen) vereinigt haben, von selbst den Grund dieser anseheinenden Verwirrung finden, und solche ohne Zweifel von selbst heben, zumal, wenn es sich bestätigen sollte, daß dieser *cruciatus* nur eine bloß zufällige *Abänderung* des *H. quadrimaculati*, nemlich *Linn.* und *Illig.*, seye.

Die in der Fn. Inf. zum *H. bipustulatus* gebrachte Synonymie fällt nun hinweg, und wird durch die bey *H. sinuatus* (nun *cruciatus*) vorkommende, ersetzt.

HISTER MINUTVS. Fn. Inf. germ. XCIII. 3.

*Hister flavicornis*. Illiger Kug. Käf. Fr. I. n. 20. p. 62.

*Hister flavicornis*, Ent. Hefte I, n. 27. p. 106.

Folglich fällt die bey *H. minutus* gebrauchte Synonymie hinweg, und wird durch vorstehende, in den Ent. Heften a. a. O. ersetzt.

HISTER NASSATVS. Fn. Inf. germ. LXVII. 8.

Ist, wie mich ein wiederholter Vergleich mit dem erst späterhin, als *Eigenthum* erhaltenen, *Hister*

*ster complanatus* Fn. Inf. germ. XXVII. 7. belehrte, zwar eine und die nehmliche Art mit demselben, iedoch wegen der schwarzen Füße, als Abart desselben zu betrachten.

HISTER DEPRESSVS. Fn. Inf. germ. LXXX. 6.

Ist standhaft vom *H. complanatus* oder *nassatus* verschieden. Das Citat Fn. Inf. germ. 67. 8. welches in den *Ent. Heft I.* p. 99. zu *depressus* gebracht, iedoch *Heft. II.* p. 127. wieder zurückgenommen worden, fällt also daselbst hinweg. Eben so ist

HISTER VULNERATVS. Fn. Inf. germ. XXXVII. 6.  
vom *Hister caesus* Fabr. als ganz verschiedene Art anzusehen,

SPHAERIDIUM COLON. Fn. Inf. germ. LXXXIV. 1.  
Vergleiche *Illiger* Mag. I. n. 10. p. 329.

SPHAERIDIUM FERRUGINEVM. Faun. Inf. germ.  
LXXXIV. 2.

*Nitidula ferruginea.* Fabric. Syst. Eleuth. I  
n. 10. p. 349.

Vergleiche *Illiger* Mag. I. n. 20. p. 90. Folglich fällt die von mir bey *Sph. ferrug.* gesetzte Synonymie hinweg, und wird mit der vom Hrn. D. *Illiger* a. a. O. angegebenen emendirt,

SPHAE-

SPHAERIDIUM GLOBOSUM. Faun. Inf. germ.  
LXXXIV. 3.

Ist ein *Anisotoma*.

SPHAERIDIUM SEMINULUM. Fn. Inf. germ. XXIII.  
tab. 2.

*Sphaeridium aeneum*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 29. p. 98.

*Sphaeridium aeneum*. Payk. Fn. Succ. I. n. 15.  
p. 65.

*Phalacrus aeneus*. Illiger Mag. I. p. 41.

Vergleiche Illiger Mag. I. n. 29. p. 329. Die  
von mir bey *Sphaerid. semin.* gebrauchte Synony-  
mie, wird folglich nach Hrn. Illigers Nachwei-  
fung a. a. O. emendirt.

ANISOTOMA GLABRA. Fn. Inf. germ. XXXVII. 9.

Hiczu gehört als Abänderung:

*Sphaeridium abdominale*. Paykull Fn. Succ. I.  
n. 23. p. 71. et III. n. 1. p. 436.

ANISOTOMA CORVSCA. Fn. Inf. germ. XXXVII. 10.

*Sphaeridium fimetarium*. Paykull Fn. Succ. I.  
n. 13. p. 64.

PHALACRUS CORVSCUS. Paykull Faun. Succ.  
App. III. n. 1. p. 438.

ANISOTOMA CORTICALIS. Fn. Inf. germ. XXXVII.  
11.

Nun *Phalacrus corticalis* Illig.



ANISOTOMA TESTACEA. Fn. Inf. germ. XXXVII.

12.

Heißt bey uns izt, *Phalacrus geminus*: denn der Name *testaceus*, muß dem *Sphaerid. testaceo* Fabr. verbleiben, welches ein wahrer *Phalacrus* ist. Illiger.

AGATHIDIVM GLOBOSVM. Fn. Inf. germ. XXXVII.

13.

*Anisotoma Seminulum*. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 5. p. 100.

Vergleiche hiemit Illiger Mag. I. p. 42, u. p. 330. Hr. D. Illiger nennt es izt: *Agathidium seminulum*.

BYRRHVS ATER. Fn. Inf. germ. XXXII. 2.

Gehört nach Illiger Mag. I. p. 330. zum *Byrrhus pilula* Fabr. dessen Abänderung derselbige ist. Siehe auch Mag. III. p. 151.

BYRRHVS MORIO. Fn. Inf. germ. XXXVII. 15.

*Byrrhus ater*. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 6. p. 104.

*Byrrhus Morio*. Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 6. p. 93.

Folglich gehört die bey *Byrrhus ater* Fn. inf. l. c. gebrauchte Synonymie hicher und das Citat, Fn. 32. 2. fällt bey *B. ater*, in Fabr. Syst. Eleuth. l. c. hinweg: so wie Fn. 37. 2. bey *B. dorsalis* Fabr. Syst. Eleuth. I. n. 7. p. 104. wegzustreichen ist.

BYRR-

BYRRHVS VNDVLATVS. Fn. Inf. germ. XXXVII.  
14.

*Byrrhus murinus*, Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 8.  
p. 104.

*Byrrhus undulatus*, Illiger Kug. Käf. Pr. I.  
n. 8. p. 94.

Nur als Abänderung gehört der *B. undul.* Illig.  
*et Faun.* nun unter *B. murin.* Fabr.

BYRRHVS MINVTVS. Fn. Inf. germ. XXV. 3.

*Byrrhus minutus*, Fabr. Syft. Eleuth. I. n. 13,  
p. 105.

BYRRHVS ORNATVS. Fn. inf. germ, XXIV. 1.

Ist eine eigene besondere Art.

TROX DVBIVS. Fn. Inf. germ. LXII. 5.

*Pinelia pygmaea*, Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 31.  
p. 133.

*Byrrhus crenulatus*, Roffi Faun. etrusc. app.  
87. 7.

Vergl. hiemit Illigers Mag. I. n. 31. p. 338.

Dieser *Trox dubius* constituirt nach Herrn D.  
Illiger eine eigene Gattung *Limnius*, wozu *Dy-*  
*tiscus Volkmar* Fn. und andere gehören.

BOLITOPHAGVS GOEDENI. Fn. Inf. germ. XCIV. 1.

*Bolitophagus interruptus*, Illiger in Wiedm.  
Zool. Archiv. I. 2. p. 112. n. 8.

Dafs

Dafs Herr D. Illiger diesen vom Herrn *Amts-*  
*rath Goeden* zu Rügenwalde entdeckten Käfer,  
dessen Mittheilung ich Herrn Senat. *Schneider* in  
Stralsund verdanke, ehebevor schon a. a. O. be-  
kannt gemacht hat, war mir damals, als ich sol-  
chen für die Faun. beschrieb, nicht bekannt.

OPATRUM AGRICOLA. Fn. Inf. germ. XLIII. 9.

*Bolitophagus Agricola*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 3. p. 114.

OPATRUM ARMATUM. Fn. Inf. germ. LXI. 2.

*Bolitophagus armatus*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 4. p. 114.

SCARITES LAEVIGATUS. Fn. Inf. germ. LXVI. 1.

*Scarites laevigatus*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 9. p. 124.

*Scarites littoralis*. Creutz. Verf. p. 134.

Es ist kein Zweifel an der Richtigkeit meiner  
Bestimmung: dieses bestättigt *Illig.* Mag. III.  
p. 152.

SCARITES THORACICUS. Fn. Inf. germ. LXXXIII. 1.

*Scarites thoracicus*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 16. p. 125.

SCARITES GIBBUS. Fn. Inf. germ. V. 1.

*Scarites gibbus*. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 17.  
p. 126.

*Paykull*. Fn. Suec. III. App. n. IV. p. 440.

SCA-

SCARITES CEPHALOTES. Fn. Inf. germ. LXXXIII. 1.

*Carabus cephalotes*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 94. p. 187.

Gewis ein *Scarites*, nun vom *Fabric.* in dem  
Syst. Eleuth. abermals unter *Carabus* gebracht.

SCARITES GAGATES. Fn. Inf. germ. XI. 1.

*Carabus clatus*. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 104.  
p. 189.

Vergleiche hiemit *Illig.* Mag. I. n. 104. p. 354.  
und Mag. III. p. 154.

SCARITES PICEVS. Fn. Inf. germ. XI. 2.

*Carabus terricola*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 43. p. 178.

*Carabus madidus*. Payk. Fn. Succ. I. n. 16.  
p. 109.

Vergleiche hiemit *Illig.* Mag. I. p. 57. und n. 43.  
p. 349. Herr *Creutzer* sagt in seinen Versuchen  
p. 115. Obf. III. *Car. terricola Fabr. ab ipso Cel.  
viro huc missus, haud alius est, quam Scarites pi-  
ceus Hellw.* — Ich habe gar nichts darwider,  
wenn sich dieses also verhält; nur gebe ich zu  
bedenken, das auch ich an Hrn. Prof. *Fabricius*  
diesen *Scar. piceus* geschickt habe, ohne von Ihm  
eine solche Bestimmung dagegen erhalten zu ha-  
ben; das Hr. Prof. *Fabricius* die Zeichnung die-  
ses Scarit. in meiner Fauna, gar wohl kennt,  
solche aber nirgends noch angeführt; das end-  
lich

lich Herr Prof. *Fabrizius* — sich — wie Fälle vor-  
handen sind — leicht irren konnte. Am sicher-  
sten wärs jedoch, wir erhielten die Bestätigung  
dieser Angabe vom Herrn Prof. *Fabrizius* selbst. —  
Der *Carab. terricola* Fn. XXX. 3. kan nicht mit  
diesem verwechfelt werden.

TENEBRIO SPINIMANVS. Fn. Inf. germ. LIX. 1.

*Pimelia laevigata.* Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 5.

p. 129.

*Pimelia glabrata.* Herbst. Nat. d. Käf. VIII. n. 12.

p. 56. tab. 120. fig. 12.

Vergleiche *Illiger* Mag. I. n. 5. p. 336.

TENEBRIO CURVIPES. Fn. Inf. germ. XI. 3.

*Tenebrio curuipes.* Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 5.

p. 145.

Ich kenne Herrn *Illigers Tenebr. loripes* Kug.  
Käf. Pr. I. n. 2. p. 113. nicht genau genug, um  
hierüber zu entscheiden: gleichwohl überzeuge  
ich mich, daß das *Fabric.* Citat mit meinem *S.*  
*curuipes* ohne Anstand vereinigt werden könne.

TENEBRIO FERRUGINEVS. Fn. Inf. germ. IX. 2.

Nur das andere Geschlecht von *Tenebrio culina-  
ris* Fab. Fn. Inf. germ. IX. 1.

TENEBRIO DIAPERINVS. Fn. Inf. germ. XXXVII.

16.

*Illiger* Kug. Käf. Pr. I. n. 4. p. 115.

Ist eine deutliche Art, die zwar mit Herbsts *Tenebrio ovatus* viele Aehnlichkeit hat, aber durch den Halschild hinlänglich unterschieden ist. Wir haben mehrere Stücke erhalten, die auf einem aus Portugall abgeseelten Schiffe unter Maiskörnern gefunden worden. Illiger.

TENEBRIO FAGI. Fn. Inf. germ. LXI. 3.

Mir immer noch eine problematische Art. Ich hatte nur dieses einzige mir von Hrn. v. Megerie damals mitgetheilte Exemplar zu Gesicht erhalten, das ich wieder zurückgegeben habe. Seitdem ist mir keines mehr vorgekommen.

PIMELIA VARIOLOSA. Fn. Inf. germ. LXXIV. 1.

*Platynotus morbillosus*. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 11. p. 140.

Vergl. Illiger Mag. I. p. 339. n. 11. wofelbst der *Platynot. morbill.* für eine schwarze Abänderung des grauen *Opatrum griseum* F. erklärt wird.

BLAPS FEMORALIS. Fn. Inf. germ. XXXIX. 5.

*Blaps femoralis*. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 12 p. 143.

*Opatrum femoratum*. Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 4. p. 109.

Ist das Männchen der nächstfolgenden Art. Vergl. Illig. Mag. I. p. 46. und p. 340.

TENEBRIO FEMORALIS. Fn. Inf. germ. XXXIX. 6.

*Blaps dermestoides*. Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 9. p. 142. excluso Syn. Illig.

*Opatrum femorale*. Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 5.  
p. 110.

Hierher gehört ohne Zweifel auch:

*Helops laevigatus*. Fn. Inf. germ. L. 6.

als eine von dem vorhergehenden *Weibchen* des  
*Blaps femoralis* Fabr. kaum zu unterscheidende  
Art.

HELOPS CARABOIDES. Fn. Inf. germ. XXIV. 3.  
ed. I.

*Helops quisquilius*. Fn. Inf. germ. XXIV. 3.  
ed. II.

*Helops dermestoides*. Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 2.  
p. 120. excluso Syn. Fabric.

*Helops striatus*. Oliv. Inf. III. 58. p. 6. n. 4.  
tab. I. fig. 4.

Der *Helops ruficollis* Fabr. ist sicher nichts, als  
ein unreifer eben entwickelter Käfer dieser Art.

Illiger. Vergl. Illig. Mag. I. n. 47. p. 344.

HELOPS CHRYSOMELOIDES. Fn. Inf. germ. LVII. 1.

Eine unter *Catops* gehörige Art, die noch näher  
bestimmt werden muß.

HELOPS DERMESTOIDES. Fn. Inf. germ. LVII. 2.

*Ptomophagus truncatus*. Illig. Kug. Käf. Pr. I.  
n. 3. p. 89.

C

Vergl.

Vergl. Illig. Mag. I. p. 42. Hieher gehört höchst wahrscheinlich als *Abänderung mit braunen Flügeldecken*:

*Helops sericeus*. Fn. Inf. germ. LXXIII. 1.

HELOPS FUSCUS. Fn. Inf. germ. XVIII. 1.

*Catops sericeus*. Paykull Fn. Suec. I. n. 1.  
p. 342.

*Diese Art muss in das künftige Catops fuscus genannt werden, weil Catops sericeus Payk. nicht der Cat. seric. Fabric. ist, der einerley mit Promophag. fornicat. Illig. ist. Illig.*

HELOPS TRISTIS. Fn. Inf. germ. VIII. 1.

*Catops Morio*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 4.  
p. 564.

*In dem Syst. Eleuth. müssen, ausser der Entom. syst. die übrigen Citate wegfallen. Illiger.*

HELOPS PICIPES. Fn. Inf. germ. XXIV. 4.

*Cistela maura*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 21.  
p. 20.

Hieher gehört als identische species, auch

*Cistela brevis*. Fn. Inf. germ. XXV. 17.

Vergl. Illiger Mag. III. n. 21. p. 162.

HELOPS LATICOLLIS. Fn. Inf. germ. XXXVI. 1.

ist das *Männchen* von *Blaps glabra* Fabric. et Faun. Inf. germ. L. 1. Vergl. Illig. Mag. III. p. 153.



HELOPS SHNEIDERI. Fn. Inf. germ. XXXIV. 1.

*Hypophloeus Boros*. Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 2. p. 558.

*Tragofita corticalis*. Paykull. Fn. Suec. I. n. 3.  
p. 93.

*Boros elongatus*. Herbst Nat. d. Käf. VII. n. 1.  
p. 319. tab. 110. fig. 7.

HELOPS SERRATUS. Fn. Inf. germ. IX. 3.

*Melandrya ferrata*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 1. p. 163.

HELOPS CANALICULATUS. Fn. Inf. germ. IX. 4.

*Melandrya canaliculata*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 2. p. 164.

CARABUS MARGINALIS. Fn. Inf. germ. XXXIX. 7.

Nach Herrn D. Illigers Bemerkung eine Abänderung des *Car. violac. F.* Vergl. detselb. Mag. I.  
p. 49. und n. 4. p. 345.

CARABUS WEIGELII. Fn. Inf. germ. LXXXIV. 4.

*Carabus nodulosus*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 14. p. 171.

CARABUS GEMMATVS. Fn. Inf. germ. LXXIV. 2.

Hieher gehört:

*Carabus hortensis*. Linn. Syst. Nat. n. 3. p. 668.  
welcher bey *C. hortensis* Fn. Inf. germ. IV. 3.  
auszustreichen.

CARABVS SYLVESTRIS. Fn. Inf. germ. V. 3.

*Carabus sylvestris*. Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 19. p. 173.

CARABVS SCHEIDLERI. Fn. Inf. germ. LXVI. 2.

*Carabus Scheidleri*. Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 24. p. 174.

Vergl. Creutzer Versuch p. 133.

CARABVS ARVENSIS. Fn. Inf. germ. LXXIV. 3.

Ist aus Versehen Fn. Inf. LXXXI. 3. nochmals  
abgebildet worden.

CARABVS CONVEXVS. Fn. Inf. germ. LXXIV. 5.

Schäffer Ic. Inf. Ratisb. tab. 38. fig. 3. ge-  
hört zwar allerdings hierher, aber auch tab. 3.  
fig. 2.

CARABVS GRANVLATVS. Fn. Inf. germ. LXXXI. 6.

Hierher gehört auch Schäffer Ic. Inf. ratisb.  
tab. 18. fig. 9. welche bey *Carab. cancellatus* Fabr.  
hinwegfällt.

CARABVS FASCIATO PUNCTATVS. Faun. Inf. germ.  
LXVII. 9.

*Carabus fasciatopunctatus*. Fabric. Syft.  
Eleuth. I. n. 42. p. 178.

*Carabus fasciatopunctatus*. Creutz. Versf.  
p. 111. n. 4. tab. 2. fig. 16. a.

Vergl. Illig. Mag. I. p. 57.

CARABUS NIGRITA. Fn. Inf. germ. XI. 13.

*Carabus maurus*. Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 45. p. 178.

Herrn Prof. *Fabrizius* ſchickte ich ſolchen, unter *Carab. anthracinus* zu, woraus ſich nun deſſen Citat hiebey erklären läßt. Schwerlich gehört derſelbe aber hieher. Vergl. *Illig. Kug. Käf. Pr. I.* n. 55. p. 181.

CARABUS LEUCOPHTHALMUS. Faun. Inf. germ.  
XXX. 1.

*Carabus niger*. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 46.  
p. 179.

*Carabus niger*. Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 56.  
p. 182.

Vergl. *Illiger Mag. I.* n. 46. p. 349. deſſen richtigere Synonymie, nur mit Ausſchluſſe *Schäffer* Ic. Inf. ratisb. tab. 18. fig. 1. hieher gehört.

CARABUS PLANUS. Fn. Inf. germ. XI. 4.

*Carabus planus*. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 47.  
p. 179.

*Carabus leucophthalmus*. Illig. Kug. Käf. Pr. I.  
n. 58. p. 183.

*Carabus leucophthalmus*. Linn. Syft. Nat. n. 4.  
p. 668.

CARABUS PICICORNIS. Fn. Inf. germ. XCII. 1.

*Carabus picicornis*. Fabr. Syft. Eleuth. I. n. 55.  
p. 180.

Ca-

- CARABVS SPINIBARBIS. Fn. Inf. germ. XXX. 6.  
*Carabus spinibarbis*. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 61. p. 181.  
Vergleiche *Carab. terminat.* Fn. p. 44.
- CARABVS DIANAÆ. Fn. Inf. germ. XXX. 8.  
*Carabus humeralis*. Fabr. Syft. Eleuth. I. n. 63. p. 181.  
Vergl. *Illig. Mag.* I. n. 63. et 66. p. 350—51. III. p. 154.
- CARABVS AFFINIS. Fn. Inf. germ. LXXIII. 9.  
*Carabus angusticollis*. Fabr. Syft. Eleuth. I. n. 64. p. 182.  
*Carabus angusticollis*, *Illig. Mag.* I. p. 55.
- CARABVS BOREALIS. Fn. Inf. germ. LXXV. 8.  
*Carabus borealis*. Fabr. Syft. Eleuth. I. n. 69. p. 183.
- CARABVS SPOLIATUS. Fn. Inf. XXXI. 6.  
*Carabus spoliatus*. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 72. p. 183.
- CARABVS CINCTVS. Fn. Inf. germ. XXX. 7.  
Ist eine befondere, aber nicht die Fabrizzische Art: Ich nenne diesen Käfer, den wir vom Rossi, als einen Sardinschen erhalten haben, und den er auch *cinctus* nennt, *Carabus circumscriptus*. Es gibt in Ostindien mehrere ähnliche Arten. *Illiger*.

Nicht

Nicht geringen Anstand fand ich schon damals; als ich diesen *Carabus* für die *Fn. Inf.* zeichnen liefs, bey der Bestimmung deselben. Soll nun *Herbst* Archiv tab. 29. fig. 7. den *C. cinctus Fabr.* vorstellen, den ich nicht kenne, so ist der meine zwar allerdings von demselben verschieden, gleichwol wird man finden, dafs die *differentia specifica* in dem *Syst. Eleuth.* auf beide anwendbar ist. Es würde demnach nur *Carabus cinctus Ross.* *Fn. Etrusc. I. n. 523. p. 212. tab. IV. fig. 9.* hieher gehören.

CARABVS FESTIVVS. *Fn. Inf. germ. XXX. 15.*

*Carabus festivus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 74. p. 184.*

*Carabus marginatus. Ross. Fn. Etrusc. I. n. 524. p. 251.*

Vergl. hiemit *Illiger Mag. I. n. 74. p. 351.* Herr D. *Illiger* wirft hiebey die Frage auf: Ist *C. zonatus Panz. Fn. germ. 31. tab. 7.* Abart? oder ist er *C. agrorum Oliv. Inf. 35. 86. 117. tab. 12. fig. 144.* und *Geoffr. Inf. I. 162. 41?*

CARABVS ZONATVS. *Fn. Inf. germ. XXXI. 7.*

Ist, wie ich nun wohl sehe, vom vorhergehenden *C. cinctus Fn. et Rossi* hinlänglich verschieden; gewis ist ers aber auch vom *C. festivus*, oder *C. marginat. Rossi.* Dasienige Exemplar,  
nach

nach welchem diese Zeichnung verfertigt worden, besitze ich nicht mehr. Auch glaube ich nicht, daß *Geoffr. I. n. 41.* hier mit in Verbindung kommen könne, zu welcher Verneinung, sowohl in der abweichenden Beschreibung, als in der gar zu verschiedenen Gröfse beider, hinreichende Gründe liegen. *Olivier* kan ich nicht vergleichen.

CARABVS EXCAVATVS. Fn. Inf. germ. XXXIV. 2.

*Carabus rufipes.* Fabr. Syst. Eleuth. I. n. 75.  
p. 184.

Vergl. *Illig. Mag. III. p. 154.* und *Mag. I. p. 58.*

CARABVS ACILIS. Fn. Inf. germ. LXXV. 11.

*Carabus agilis.* Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 83.  
p. 185.

Hierher gehört nach *Illigers Mag. I. n. 83. p. 352.* ohngeachtet der anscheinenden Verschiedenheit:

*Carabus atricapillus.* Fn. Inf. germ. XXX. 9.

CARABVS TAENIATVS, Fn. Inf. germ. XXXIV. 3.

*Carabus oblongus.* Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 90. p. 186.

CARABVS PAVIDVS. Fn. Inf. germ. LXXIII. 7.

*Carabus pallipes.* Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 91. p. 187.

CARABVS TENEBROIDES. Fn. Inf. germ. LXXIII. 8.

*Carabus gibbus*. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 105.  
p. 189.

CARABVS DEPRESSVS. Fn. Inf. germ. XXXI. 8.

*Carabus cassideus*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 108. p. 190.

Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 23. p. 159.

CARABVS SABVLICOLA. Fn. Inf. germ. XXX. 4.

*Carabus sabulicola*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 110. p. 190.

Nicht nur im Oestreichischen, sondern auch um Göttingen sehr häufig. Herr D. Illiger hält diese Art nur für eine *Abänderung* des *C. obscurus*. Sonach käme die Abänderung weit öfters vor als die Stammart.

CARABVS BINOTATVS. Fn. Inf. germ. XCII. 3.

*Carabus binotatus*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 126. p. 193.

Ogleich ein und anders, was Herr D. Illiger bey diesem *C. binotatus* Kug. Käf. Pr. I. n. 37. bemerkt, nicht ganz zutrifft, so zweifle ich doch nicht an der Richtigkeit dieser Bestimmung.

CARABVS KUGELANI. Fn. Inf. germ. XXXIX. 8.

*Carabus dimidiatus*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 129. p. 194.

Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 30. p. 166.

Nicht

Nicht bezeichnete ich diesen schönen Käfer, mit dem Namen eines so vorzüglichen Entomologen, *um die Aufmerksamkeit (?) auf sich zu ziehen*, sondern *darum* behielte ich den Namen *Carab. dimidiatus*, unter welchem derselbe mir von dem Herrn Prof. *Hellwig* zugeschickt worden ist, nicht bey, weil *Fn. Inf. germ. XXXVI. 3. bercits ein Carabus dimidiatus vorgekommen ist.*

CARABUS ALPINUS. *Fn. Inf. germ. LXXV. 7.*

*Carabus alpinus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 140. p. 196.*

Man vergleiche *Illig. Mag. I. n. 140. p. 355.* wofelbst

*Carabus torridus. Fn. Inf. germ. XXXVIII. 2.*

*Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 42. p. 173.*

als *schwarze Abänderung* hierher gebracht wird. Man vergleiche übrigens dieser beiden Abbildung. Ich besitze den *C. torridus* nicht, um hierüber mich zu erklären.

CARABUS CHLOROPHANUS. *Fn. Inf. ger. LXXIII. 3.*

*Carabus azureus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 145. p. 196.*

Vergl. *Illig. Mag. I. p. 51.*

CARABUS AENEUS. *Fn. Inf. germ. LXXV. 4.*

*Carabus aeneus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 146. p. 197.*

Hie-



Hierher gehört mit Recht, als Abänderung:  
*Carabus azureus*. Fn. Inf. germ. LXXV. 3.

Vergl. *Illig. Mag.* I. n. 146. p. 356.

CARABUS ATERRIMVS. Fn. Inf. germ. XXX. 12.

*Carabus aterrimus*. Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 155. p. 198.

Herr D. *Illiger* glaubt, dafs zwar diese Abbildung den *C. aterr. F.* vorstelle, dafs solche jedoch nicht zum besten gerathen feye. — Das glaube wohl auch ich, nur mufs ich anfügen, dafs dieser *aterr.* vom Herrn *Sturm* richtig gezeichnet, nur nachher erst von den Illuministen verdorben worden.

CARABUS NIGRICORNIS. Fn. Inf. germ. VI. 4.'

*Carabus austriacus*. Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 157. p. 199.

Der *Fabriz*, *C. nigricorn*, gehört als *Abänderung* unter *Car. holoserice. F.*

CARABUS CONFLVENS. Fn. Inf. germ. XXX. 22.

*Carabus nigrita*. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 164.  
p. 200.

*Illiger Kug. Käf. Pr.* I. n. 47. p. 175.

Der *Carab. confluens* Fn. gehört nur als eine etwas ungewöhnliche *Ausart* hierher. Vergl. *Illig. Mag.* I. p. 154.

CARABUS LUTESCENS. Fn. Inf. germ. XXX. 20.

*Carabus picipes*. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 183.  
p. 203.

Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 85. p. 199.

CARABUS TERMINATUS. Fn. Inf. germ. VII. 2.

*Leistus testaceus*. Frölich Naturf. XXVIII.  
p. 8. n. 1. tab. 1. fig. 9.

*Carabus rufescens*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 191. p. 205.

Vergl. Illiger Kug. Käf. Fr. I. p. 59. und n. 70.  
p. 190. wornach auch folgende, als Spielarten,  
hieher gehören:

β *Carabus Bruçteri*. Fn. Inf. germ. XXXIV. 4.  
var. *elytris obscurioribus*.

γ *Carabus spinilabris*. Fn. Inf. germ. XXXIX.  
11. var. *elytris apice concoloribus*.

*Carabus spinilabris*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 189. p. 204.

Desgleichen gehört auch hieher:

δ *Manticora fuscoaenea*. Fn. Inf. germ. LXXXIX.  
3. var. *elytris pallidioribus: apice concoloribus*.

Dieser *Carabus rufescens* Fabr. mit seinen eben  
genannten, bis igt bekannten Abänderungen, be-  
stimmt zugleich mit:

*Carabus spinibarbis*. Fn. Inf. germ. XXX. 6.

*Manticora pallipes*. Fn. Inf. germ. LXXXIX. 2.

*Carabus spinibarbis*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 61. p. 181.

eine

eine eigene Gattung, zu welcher, theils bereits ehebevor Herr D. Illiger Kug. Käf. p. 190. u. f., theils Herr D. Frölich im Naturforscher XXVIII. p. 8. die charakteristischen Kennzeichen angegeben haben, und zwar letzter, unter der Benennung *Leiftus*, so wie Latreille unter dem Namen *Pogonophorus*. Die Idee des Herrn Prof. Jurine, solche der Gattung *Manticora* einzuverleiben, — und die ich, wie ich nun gerne gefehe, mit Vernachlässigung der von mir bisher strenge beobachteten Observanz, nur die Fabricius'schen Gattungen beyzubehalten, jedoch um dem Antrag des Herrn Prof. Jurine meine Achtung zu bezeugen, hier in einen sonst ungewöhnlichen Umlauf gebracht habe, scheint nach dem Urtheil mehrerer einsichtsvollen Entomologen, unter welchen ich besonders Herrn D. Illiger in Braunschweig nennen darf, sehr vieles wider sich zu haben, um auf eine vollkommene Realisirung, Ansprüche zu machen. Ohne noch selbst im Stand zu seyn, die Verschiedenheit der Fresswerkzeuge an einem Exemplar der *Manticorae Fabric.* beobachten zu können, so sind doch solche, so wie solche vom Latreille und Olivier beobachtet worden sind, besonders in Rücksicht der Lippe, und daß die Erdspize der Kinnlade (der *Manticorae*) mit der Kinnlade zusammengliedert ist, so geeignet, und zwar, wenn man auch auf die übrige

ge Beschaffenheit mit hinsehen will, zumal die Flügeldecken den ganzen Hinterleib umfassen, auch übrige Umrifse und Verhältnisse so verschieden, daß eine solche Vereinigung nicht statt finden kan.

CARABVS VNIFASCIATVS. Faun. Inf. germ. XXXVIII. 7.

*Carabus Discus*, Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 200. p. 207.

CARABVS VERNALIS. Fn. Inf. germ. XXX. 17.

*Carabus vernalis*, Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 202. p. 207.

Vergl. *Illig. Mag.* I. p. 53. u. n. 202. p. 359. wofelbst an diesem Citat gezweifelt wird: indeffen habe auch ich diesen *Carab.* unter meiner frühern Benennung Herrn Prof. *Fabrizius* zugeschickt, und nicht selten gesehen, daß dieser Käfer auch mit braunen Füßen vorkomme.

CARABVS ABBREVIATVS. Fn. Inf. germ. XXXVI. 2.

*Carabus abbreviatus*, Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 215. p. 209.

*Anthophagus caraboides*, Gravenhorft. coleopt. micropt. n. 1. p. 121.

CARABVS AQUATICVS. Fn. Inf. germ. XXXVIII. 10.

*Carabus minutus*, Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 218. p. 210.

CARABVS ORICHALCEVS. Faun. Inf. germ.  
XXXVIII. 11.

*Carabus pygmaeus*. Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 219. p. 210.

CARABVS VESPERTINVS. Fn. Inf. germ. XXXVII.  
tab. 6.

Hierüber laſſe ich Herrn D. Illiger ſelbſt ſprechen: *Dieſer C. vespertinus iſt eine beſondere Art, wovon die Abänderungen häufiger ſind, deren Flügeldecken faſt ganz ſchwarz und blaß am Außenſaum ſind. Solche nennt Herr v. Megerle im Wiener Auktions Catalog Carab. Ziegleri. Meine Vermuthung, daß Carab. cruciger Fabric. dieſer vespertinus ſeye, iſt falſch. Fabricius cruciger iſt nichts als C. merdarius; die differentia ſpecifica des alten Käfers hat ihn verleitet, ihn noch einmal anzunehmen, weil die futura in ienen nicht angegeben war. Der Name C. vespertinus bleibt alſo.*

CARABVS CISTELOIDES. Fn. Inf. germ. XI. 12.

*Vom Car. fuscus Fabr. oder C. ambiguus Paykull. iſt er ſtandhaft verſchieden. Illiger. Jedoch gehört Schaffer. Ic. Inf. ratisb. tab. 18. fig. 7. hieher. Vergl. meine ſystem. Nomencl. der Schöff. Inf. p. 25.*

CARABUS TERRICOLA. Fn. Inf. germ. XXX. 3.

*Carabus subcyaneus*. Illig. Mag. I. p. 57.

Vergl. Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 59. p. 184.

Ich will sehr gerne zugeben, daß dieser *terricola*, oder nun dieser Illigersche *subcyaneus*, nicht der *C. terricola* Fabric. seye. S. oben *Scarit. piceus*: indessen wenn es auf den Umstand *alleine* ankommt, daß der wahre Fabric. *C. terricola*, *elytra striis levibus*, oder *impunctatis* haben soll, so kan der *Scar. piceus*, oder *Carab. madidus* Payk. der wohl keine *elytra striis levibus* hat, kaum auch hierher gerechnet werden.

*Carabus subcyaneus* bestimmt eine eigene Art: nur kan

*Carabus inaequalis*. Fn. Inf. germ. XXX. 18. deswegen nicht hierher gerechnet werden; weil dessen *elytra nigra nitida striis levibus*, allzuehr mit den *elytris obscuero-cyaneis opacis punctato striatis* des *subcyanei*, contrastiren. Außerdem ist dieses Exemplar, nach welchem die Zeichnung für meine Fn. Inf. gefertigt worden, noch ein unreifes, nur ohnlängst seinen Nymphenstand verlassen habendes Exemplar, welches dessen *elytra fuscescentia* zur Genüge beweisen.

CARABUS ARTICULATUS. Fn. Inf. XXX. 21.

Ich zweifle jedoch an der Identität dieser vorgeschlagenen Art. Nach Herrn D. Illigers Gutachten,

achten, ist dieser *articulat*, dennoch von der *bun-*  
*ten Abänderung* des *Carabus pulchelli* Fn. Inf.  
germ. XXXVIII. 18. verschieden, weswegen nun  
auch dieses Citat in *Ill. Kug. Käf. Pr. bey E. qua-*  
*drim. var. β.* p. 233. hinwegfällt.

CARABVS DIMIDIATVS. Fn. Inf. germ. XXXVI. 3.

Wahrscheinlich ein Gravenhorffscher *Antho-*  
*phagus*, den ich jedoch in den *Coleopteris mi-*  
*cropteris* vermiss.

CARABVS VIDVVS. Fn. Inf. germ. XXXVII. 18.

Eine besondere Art, wahrscheinlich *Carabus*  
*vernalis* Payk. Fn. Suec. I. 133. 46. und *Carabus*  
*obscurus* Payk. Mon. Car. 40.

CARABVS NIVALIS. Fn. Inf. germ. XXXVII. 19.

*Carabus vivalis*. Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 79.  
p. 197.

In dem mir vom Herrn Prof. *Hellwig* zuge-  
schickten Manuskript, wofelbst dieser *Carab. vi-*  
*valis*, nebst seiner different. specifica angezeigt  
worden, glaubte ich *deutlich* *nivalis* zu lesen.  
Dieser *Irrthum* wird nun in Herrn D. *Illigers*  
Kug. Käf. Pr. a. a. O. gerügt, und ich verbessere  
diesen *Irrthum* gerne, da ich nun mit der *wah-*  
*ren Lesart* bekannt gemacht worden bin.

CARABVS EYRINOTVS. Fn. Inf. germ. XXXVII.  
23.

*Carabus acuminatus*, Payk. Fn. Suec. I. n. 36.  
p. 166.

Nicht *Eyrinotus*, sondern *Eurynotus* muß in der Fn. Inf. a. a. O. gelesen werden. In Schöffers Ic. Inf. ratisb. tab. 194. fig. 7. kommt eine sehr übelgerathene Abbildung des *Carab. acneus Fabr.* vor, nicht aber dieser *C. Eurynotus Illig.* Vergl. *meine system. Nomencl. d. Schöff. Inf.* p. 169.

CARABVS GRISEVS. Fn. Inf. germ. XXXVIII. 1.

Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 38. var.  $\beta$ . p. 171.

Vergl. *Illig. Mag. I.* p. 52. Herr D. Illiger schrieb mir auch nachgehends: *dieser C. griseus scheint doch vom C. ruficornis verschieden zu seyn, denn er ist standhaft nur halb so groß.*

CARABVS AVLICVS. Fn. Inf. germ. XXXVIII. 3.

*Carabus bicolor*, Paykull Fn. Suec. I. n. 79.  
p. 159.

Vergl. *Illig. Mag. I.* p. 53.

CARABVS TEMPESTIVVS. Fn. Inf. germ. LXXIII. 6.

*Scheint C. rubens Fabr. Ent. syst. I. n. 92. p. 187. zu seyn. Illiger.*

CARABVS HELLWIGII. Fn. Inf. germ. LXXXIX. 4.

CARABVS HOFFMANNSEGGII. Faun. Inf. germ.  
LXXXIX. 5.



CARABVS ILLIGERI. Fn. Inf. germ. LXXXIX. 6.

CARABVS PANZERI. Fn. Inf. germ. LXXXIX. 8.

Sind allerdings verschiedene, aber übel benannte Arten. Sollen die Namen ein Denkmahl der Erinnerung seyn, so lege man sie sehr kennzlichen unzweideutigen Arten bey. — Die schwarzen Carabi sind für den Kenner schon schwer aus einander zu finden, wie vielmehr für den blossen Dilettanten. Illiger.

Ich fühlte die Wahrheit des so eben gefagten nur zu sehr, als ich diese von der Natur mit so kargen Signaturen dotirten Carabos in der Fn. Inf. aufnahm. Aber ihre einmal von Herrn v. Megerle ihnen zugetheilten Namen, wollte ich nicht ändern.

CARABVS PVLCELLVS. Fn. Inf. germ. XXXVIII. 8.

*Bembidium quadrimaculatum*. Illig.

*Elaphrus quadrimaculatus*. Illig. Kug. Käf. Pr. I.  
n. 17. p. 232.

Herr D. Illiger, nemt nun mit Latreille, (vergl. Illig. Mag. III. n. 9. p. 11.) die schon ehebevor errichtete 2te Familie der Elaphror. (Kug. Käf. Pr. I. p. 226.) *palpis apice mucronatis*, *Bembidion*, unter welche mehrere, auch in meiner Fn. Inf. abgebildete, nun gehören.

CARABVS DECORVS. Fn. Inf. germ. LXXIII. 4.

*Bembidium rufipes*. Illig.

*Elaphrus rufipes*. Illig. Mag. I. p. 63.

Diese Bestimmung bestätigt nun Herr D. Illiger selbst.

CARABVS QVADRINOTATVS. Faun. Inf. germ.

LXXIII. 5.

*Bembidium spilotus*. Illig. Kug. Käf. Pr. I.  
p. 234.

Vergl. Illig. Mag. I. p. 64.

CARABVS DORIS. Fn. Inf. germ. XXXVIII. 9.

*Bembidium Doris*. Illig.

*Elaphrus Doris*. Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 16.  
p. 232.

CARABVS LITTORALIS. Fn. Inf. germ. XL. 6.

*Elaphrus rupestris*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 9. p. 246.

*Bembidium rupestre*. Illig.

*Elaphrus rupestris*. Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 13.  
p. 230.

CARABVS STURMII. Fn. Inf. germ. LXXXIX. 9.

*Bembidium Sturmii*. Illig.

*Bembidium posticellum*. Illig. alias, f. d.

ELAPHRVS PALVDOSVS. Fn. Inf. germ. XX. 4.

*Bembidium paludosum*. Illig.

Hin-

Hinlänglich vom *Bembid. impress.* oder dem  
*Elaphr. impress.* Fn. Inf. germ. XL. 8. et *Fabric.*  
verschieden.

ELAPHRUS RUFICOLLIS. Fn. Inf. germ. XXXVIII.

21.

*Bembidium ruficalle.* Illig.

Eine sehr distinkte species.

ELAPHRUS AQUATICUS. Fn. Inf. germ. XX. 3.

*Elaphrus semipunctatus.* Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 8. p. 246.

Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 1. p. 224.

Vergl. Illig. Mag. I. n. 7. p. 66.

CICINDELA ANGVSTATA. Fn. Inf. germ. X. 1.

*Odacantha melanura.* Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 1. p. 228.

Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 93. p. 209.

SCOLYTVS AENEVS. Fn. Inf. germ. VIII. 2.

*Diaperis aenea.* Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 5.  
p. 586.

Herr Prof. *Fabric.* citirt den *Scolytus aeneus* Fn.  
bey *Diaperis bicolor*, dieser ist aber hinlänglich  
hievon verschieden. Vergleiche Fn. Inf. germ.  
XCIV. 9.

HYDROPHILVS SCARABAEOIDES. Faun. Inf. germ.

LXVII. 13.

*Hydro-*

*Hydrophilus scarabaeoides.* Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 9. p. 251.

Wahrscheinlich hat diese sonderbare Zeichnung Veranlassung gegeben, das diese Figur noch nirgends, und zumal nicht bey *Hydr. scarab.* angeführt worden ist. So viel ist gewis, das mein Exemplar, nach welchem diese Zeichnung für meine Fn. Inf. gefertigt worden ist, mit dem *Hydr. scarab. Fabr.* allerdings übereinkomme, nur sind die mittlern Streifen der Flügeldecken an der Basis derselben nicht stark genug, oder nur weniger sichtbar, wie bey andern Exemplaren, die ich damit verglichen habe, und darum sind solche, gleichsam als ob sie ganz fehlten, welches aber nicht ist, gar nicht angezeigt worden.

HYDROPHILUS CHRYSOMELINUS. Fn. Inf. germ. LXVII. 14.

*Hydrophilus griseus.* Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 24. p. 253.

Vergl. *Illig. Mag.* I. n. 24. p. 368. Auch *Hydr. bicolor Fabr.* gehört hieher.

HYDROPHILUS BIPUNCTATUS. Faun. Inf. germ. LXVII. 15.

*Hydrophilus bipunctatus.* Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 26. p. 254. so wie

*Hydro-*

*Hydrophilus striatulus*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 25. p. 254.

Vergl. Illig. Mag. I. n. 26. p. 369.

HYDROPHILVS SCROBICVLATVS. Fn. Inf. germ.  
LXVII. 11.

Eine eigene Art, die mir seitdem nicht wieder  
vorgekommen ist.

DYTISCVS STRIATVS Mas. Faun. Inf. germ.  
LXXXVI. 5.

*Dytiscus fuscus*. Fabric. Syst. Eleuth, 1. n. 17.  
p. 261.

Vergl. Illig. Mag. I. p. 69. und n. 16. p. 370.  
Folglich muß mein *D. striat.* Fn. auch unter  
*D. fuscus* Fabr. gehören.

DYTISCVS ZONATVS. Fn. Inf. germ. XXXVIII. 13.

*Dytiscus zonatus*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 22. p. 262.

Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 6. p. 257.

Vergl. Illig. Mag. I. p. 69.

DYTISCVS AENEVS. Fn. Inf. germ. XXXVIII. 16.

*Dytiscus fenestratus*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 32. p. 264.

Vergl. Illig. Mag. I. n. 32. p. 371.

DYTISCVS FENESTRATVS. Fn. Inf. germ. XC. 1.

*Dytiscus guttatus*. Payk. Fn. Succ. 1. n. 20.  
p. 211.

Man

Man streiche alle Citata hinweg, nur *Paykulls* bleibt. Dagegen fällt dieses vom *Fabrizius* bey *Dytisc. fenestrat.* gebrauchte weg. Herrn *D. Illigers* *Dytisc. guttatus* *Mag. I. p. 72.* — der nun *D. guttulus* von ihm genennet wird, ist von diesem ganz verschieden.

*DYTISCUS ATER.* *Fn. Inf. germ. XXXVIII. 15.*

*Dytiscus ater.* *Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 33,*  
*p. 264.*

*Illiger* *Kug. Käf. Pr. I. n. 11. p. 259.*

*DYTISCUS AGILIS.* *Fn. Inf. germ. XC. 2. Mas.*

*Dytiscus bilineat. var.* *Degeer. IV. n. 6. β,*  
*p. 228.*

*Dytiscus agilis.* *Paykull. Fn. Suec. I. n. 6,*  
*p. 197.*

*DYTISCUS ADSPERSUS.* *Fn. Inf. germ. XXXVIII.*  
*18. Fem.*

*Dytiscus adpersus.* *Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 16,*  
*p. 161.*

*Dytiscus agilis.* *Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 44.*  
*p. 266. Mas.*

*Dytiscus adpersus.* *Fabric. Syft. Eleuth. I.*  
*n. 51. p. 267. Fem.*

Herr *D. Illiger* *Mag. I. p. 71. u. p. 373.* zieht noch den *D. collaris* *Paykull* *Fn. Suec. I. n. 9,*  
*p. 200.* hieher, den ich nicht genau kenne. Die-  
fen

fen *D. agilis* aber habe ich vom Herrn v. *Paykull* selbst erhalten, weshalb ich um so weniger Anstand nehmen konnte, diese Berichtigung hier anzuschließen.

DYTISCUS INAEQUALIS, Fn. Inf. germ. XIV. 8.

*Dytiscus maculatus*, Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 45. p. 266.

Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 18. p. 262.

DYTISCUS ELEGANS, Fn. Inf. germ. XXIV. 5.

*Dytiscus depressus*, Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 56. p. 268.

Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 22. p. 265.

Vergl. *Illiger* Mag. I. p. 77. und n. 56. p. 373.

*Fabrizius* erwähnt freylich der Linien auf den Flügeldecken nicht, indessen gedenkt doch ihrer *Paykull* bey *f. depress.* Fn. Suec. I. n. 30. bestimmt, auch sagt derselbe bey *f. alpino* Fn. Suec. I. n. 36. der höchst wahrscheinlich nur als Abänderung hieher gehört: *lineae nigrae interdum valde obsoletae.*

DYTISCUS DORSALIS, Fn. Inf. germ. XIV. 2.

*Dytiscus dorsalis*, Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 57. p. 269.

Gehört als eine feltene Abänderung, *thorace punctis duobus dorsalibus rufis*, allerdings hieher.

DYTISCUS LITVRAIVS. Fn. Inf. germ. XIV. 4.

*Dytiscus sexpustulatus*. Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 58. p. 269.

DYTISCUS OBLIQUVS. Fn. Inf. germ. XIV. 6.

*Dytiscus obliquus*. Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 69. p. 270.

Dieser *D. obliq.* constituirft nach Hrn. D. Illiger, eine eigene Gattung, unter dem Namen *Cnemidotus*, wohin auch *Dytisc. elevatus* Fn. *imprefsus* Fab. und *marginepunctatus* Fn. gehören.

DYTISCUS MARGINEPVNCTATVS. Fn. Inf. germ.  
XIV. 10.

Ist eine eigene Art, die nun nach Hrn. D. Illigers schriftlicher Versicherung, nicht mit dem *D. Impressus* Fn. XIV. 7. vereinigt werden kan.

DYTISCUS ARCVATVS. Fn. Inf. germ. XXVI. 1.

*Dytiscus arcuatus*. Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 74. p. 271.

Vergl. Illig. Mag. I. p. 78. als Abänderung des *D. pictus* Fabr. hier erklärt.

DYTISCUS TRIFIDVS. Fn. Inf. germ. XXVI. 2.

*Dytiscus geminus*. Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 75. p. 272.

Vergl. Illig. Mag. I. p. 77.

DYTISCUS OBSCVRVS. Fn. Inf. germ. XXVI. 3.

*Dytiscus interruptus*, Fn. Inf. germ. XXVI. 5.

Dy-



*Dytiscus minutus*. Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 72. p. 272.

DYTISCVS COLLARIS. Fn. Inf. germ. XXVI. 4.  
ed. I.

*Dytiscus reticularis*. Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 80. p. 273.

Diese Bestimmung (Vergl. Faun. Inf. germ.  
XXVI. 4. ed. II.) beftätigt Illig. Mag. I. p. 79.

DYTISCVS CHALCONATVS. Fn. Inf. germ. XXXVIII.  
17.

Eine eigene Art: statt *chalconatus*, lese man  
*chalconotus*.

DYTISCVS ELEVATVS. Fn. Inf. germ. XIV. 9.  
Ein *Cnemidotus*.

DYTISCVS VOLCKMARI. VII. 4.

Heißt bey mir *Limnius Volckmari*. Zu dieser  
neuen Gattung habe ich noch folgende Arten: *Lim-*  
*nius Megerlei* (der D. *Volckmari* Catalog. Vienn.)  
die *Pimelia pygmaea* Fabr. (ihr *Trox dubius* Faun.)  
den *Elophorus cothurnatus* Zenker, und eine die-  
sem ähnliche ausländische Art, *Limn. araneolus*, n.  
Illiger.

CLERVS SCUTELLARIS. Fn. Inf. germ. XXXVIII.  
19.

Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 1. p. 282.

Ist ein *Corynites*.

TILLVS ELONGATVS. Fn. Inf. germ. XLIII. 6.

*Tillus elongatus.* Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 1.  
p. 282.

Ist nach der Versicherung des Hrn. D. *Illigers*,  
nach Hrn. Pfarrer *Müllers* in Odenbach Erfah-  
rungen, nur das *Weibchen*, wozu

LAGRIA ATRA. Fn. Inf. germ. VIII. 9.

*Tillus ambulans.* Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 4.  
p. 282.

als das *Männchen* gehört.

TILLVS FILIFORMIS. Fn. Inf. germ. LXVII. 17.

*Dasytes linearis.* Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 11.  
p. 73.

NOTOXVS SERRICORNIS. Fn. Inf. germ. XXXI. 17.

*Anthicus Rhinoceros.* Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 3. p. 289.

Herr D. *Illiger* zweifelt indess noch, ob der  
*Fabriz. A. Rhin.* hierher gehöre.

NOTOXVS BIPUNCTATVS. Fn. Inf. germ. XXVI. 9.

*Anthicus bipunctatus.* Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 11. p. 291.

Vergl. *Illig. Mag.* I. n. 11. p. 377.

NOTOXVS THORACICVS. Fn. Inf. germ. XXIII. 6.  
ed. I.

*Anthicus pedestris.* Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 12.  
p. 291.

Diese

Diese richtige Bestimmung (vergl. Fn. Inf. germ. XXIII. 6. ed. II.) bestätigt Herr D. *Illiger* durch die Bemerkung, daß nicht alle Exemplare dieses *Anthic.* an den Vordersehenkeln einen Zahn haben: jedoch gehört als Abänderung hieher:

*Notoxus cquestris*. Fn. Inf. germ. LXXIV. 8.

NOTOXVS MINUTVS. Fn. Inf. germ. XXIII. 5.

*Anthicus minutus*. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 20.  
p. 292.

Die Zweifel über diese Bestimmung, vermehren sich dadurch, daß Herr Prof. *Fabrizius*, ungeachtet der Einwendung des Herrn D. *Illigers* (Kug. Käf. I. p. 294.) wenn gleich selbst zweifelhaft, dessen *Bryaxis Schneideri* hier anführt. Wenigstens kan diese Art nicht unter den *Anthicis* stehen bleiben.

NOTOXVS CALYCINVS. Fn. Inf. germ. VIII. 3.

Ist höchst wahrscheinlich nur Abänderung des *Anthic. floralis Fabr.* et Fn. Inf. XXIII. 4. und vielleicht nur das andere Geschlecht.

NOTOXVS NECTARINVS. Fn. Inf. germ. XXIII. 7.

Bis izt noch eine eigene, unter *Anthicus* gehörige Art.

NOTOXVS BIFASCIATVS. Fn. Inf. germ. VI. 3.

*Dircaea bifasciata*. Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n, 5. p. 90.

No 7

NOTOXVS DVBIVS. Fn. Inf. germ. XI. 13

*Dircaea dubia*, Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 6.  
p. 90.

PSELAPHVS IMPRESSVS. Fn. Inf. ger. LXXXIX. 10.

Aehnlich dem *Pfelaph. sanguin. Fabr.* jedoch verschieden.

PSELAPHVS MUCRONATVS. Fn. Inf. germ. LXXXIX.

11.

Die *femora postica* sind nicht *apice*, sondern *basi mucronata*, wie ich a. a. O. irrig schrieb. Auch ist dieser *mucro* nichts anders als ein *processus coxae femorum*.

CANTHARIS ABDOMINALIS. Faun. Inf. germ. LXXXIV. 5.

Wahrscheinlich ist hier eine (jedoch von mir nicht veranlafste) Verwechslung, mit einer übrigens bekannten Art vorgegangen. Kaum kan ich solche für die wahre *C. abdominalis Fabr.* halten, weil dessen Beschreibung so sehr widerspricht. Vielleicht ist sie eher Abänderung von *Cantharis livida Illiger*. Dafs indessen die *abdominalis also* abändern sollte, darüber habe ich keine Erfahrung.

CANTHARIS TRISTIS. Fn. Inf. germ. LXXXIV. 6.

Oder soll diese Figur, die *C. abdominalis Fabric.* vorstellen? wenigstens paßt dessen Beschreibung eher hierauf.

CAN-

CANTHARIS NIVEA. Fn. Inf. germ. LVII. 5.

*Cantharis clypeata*. Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 7.  
p. 299.

CANTHARIS BICOLOR. Fn. Inf. germ. XXXIX. 13.

Schäffer Icon. Inf. Ratisb. tab. 16. fig. 15.

Panzer System. Nomencl. der Schöff. Inf.  
p. 23.

Vergl. Illiger Kug. Käf. Pr. I. p. 297.

CANTHARIS MELANOCEPHALA. Faun. Inf. germ.  
XXXIX. 12.

Scheint bis izt noch eigene Art zu seyn.

DERMESTES MACELLARIUS. Fn. Inf. germ. XL. 9. †

*Dermestes macellarius*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 4. p. 313.

Vergl. Illig. Mag. I. n. 4. p. 383. Bey wiederholtem Vergleich dieses, mit dem *D. murinus* F. finde ich, das diese Bestimmung keine Abänderung leiden kan. Er ist nicht *Derm. lanarius* Illig. Mag. I. p. 85. den ich gar wohl kenne. Bey meinem *D. macellarius* ist der ganze Unterleib, so wie die Brust, pechbraun, und keine Spur daran von einem *tomento albofericeo*.

DERMESTES MVRINVS. Fn. Inf. germ. XL. 10.

*Dermestes vulpinus*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 12. p. 314.

DERMESTES CATA. Fn. Inf. germ. XL. 11.

*Dermeſtes murinus*. Fabric. Syſt. Eleuth. I.  
n. 15. p. 315.

DERMESTES FVNGORVM. Fn. Inf. germ. XXXIX.  
14.

*Dermeſtes Lycoperdi*. Fabric. Syſt. Eleuth. I.  
n. 17. p. 315.

Vergl. *Illig. Mag.* I. n. 17. p. 384.

DERMESTES ADSTRICTOR. Fn. Inf. germ. LXXV.  
15.

*Dermeſtes adſtrictor*. Fabric. Syſt. Eleuth. I.  
n. 24. p. 316.

*Throſcus adſtrictor*. Walcken. Faun. pariſ. I.  
p. 199.

Vergl. *Entom. Heſte* II. p. 113.

DERMESTES SEXDENTATVS. Fn. Inf. germ. XIV. 11.

*Dermeſtes ſexdentatus*. Fabric. Syſt. Eleuth. I.  
n. 25. p. 317.

Vergl. *Illig. Mag.* I. n. 25. p. 384. Hieher ge-  
hört auch *Colydium frumentar.* Fabric. Syſt.  
Eleuth. II. n. 11. p. 557. welches eine und die  
nehmliche Art iſt.

DERMESTES LVNATVS. Fn. Inf. germ. LXXV. 4.

*Dermeſtes lunatus*. Fabric. Syſt. Eleuth. I.  
n. 26. p. 317.

DERMESTES UNIDENTATUS. Fn. Inf. germ. III. 6:

*Dermeſtes unidentatus*. Fabric. Syſt. Eleuth. I.  
n. 27. p. 384.

DERMESTES RUFITARIS. Fn. Inf. germ. XXXV. 6.

*Dermeſtes nigripes*. Fabric. Syſt. Eleuth. I.  
n. 29. p. 318.

Vergl. Illig. Kug. Käf. Pr. I. p. 318.

DERMESTES PICIPES. Fn. Inf. germ. XIV. 12.

*Dermeſtes obſcurus*. Fabric. Syſt. Eleuth. I.  
n. 30. p. 318.

DERMESTES SCANICVS. Fn. Inf. germ. IV. 9.

*Engis humeralis*. Fabric. Syſt. Eleuth. II. n. 2.  
p. 583.

DERMESTES VINI. Fn. Inf. germ. XL. 14.

*Dermeſtes cellaris*. Fabric. Syſt. Eleuth. I. n. 40.  
p. 319.

Iſt nichts ſanders, als der eben genannte *D. cellaris*, wie mich ein wiederholter Vergleich dieſes mit dem wahren *D. cellaris F.* belehrte. Allerdings iſt vor der Mitte des Seitenrandes am Halsſchilde, noch ein kleines Zähnchen, das beym Zeichnen überſehen worden iſt.

DERMESTES TOMENTOSVS. Fn. Inf. germ. XL. 12.

*Dermeſtes tomentosus*. Fabric. Syſt. Eleuth. I.  
n. 22. p. 316.

E -

Dieſe

Diese Figur, wiewohl nicht nur von den Illuministen verdorben, sondern auch in der Originalmahlerey ganz verfehlt, soll nichts destoweniger, *nur diesen D. tomentosus Fabr. und sonst keinen andern Käfer vorstellen.* Das nehmliche Exemplar, nach welchem diese Zeichnung gefertigt worden ist, conservire ich noch in meiner Sammlung unter Nr. 1144. womit auch die Sturmische Originalmahlerey, zum Beweifs, das keine Verwechslung vorgehen konnte, von dessen eigener Hand, noch bezeichnet ist. Ich werde indeffen, um diesen Umstand ganz zu berichtigen, in dem 97ten Hefte meiner Faune, eine wiederholte Zeichnung dieses Derm. tomentos. Fabr. vorzulegen nicht unterlassen. Dieses Citat fällt demnach bey *Melyris pallipes Illig. Mag. T. p. 83.* hinweg.

DERMESTES QUADRIPUSTVLATVS. Faun. Inf. germ.  
VI. 6.

*Engis sanguinicollis.* Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 5. p. 584.

DERMESTES PORCATVS. Fn. Inf. germ. XXIII. 8.  
*Lathridius scabratus.* Illig.

Vom *Lathr. Herbst* u. *Kugel.* ganz verschieden.  
Herr D. *Illiger* nennt ihn nun *Lathridius scabratus.*



DERMESTES ATER. Fn. Inf. germ. XXIII. 9. ed. I.

*Dermestes fimetarii*. Fn. Inf. germ. XXIII. 10.  
ed. II.

*Cryptophagus fuscus*. Knoch.

Er ist nicht *Catheretes ater Herbst.* Nach Hrtn.  
D. Illiger, führt er nun den Namen *Cryptophagus  
fuscus Knoch.*

DERMESTES SEMICOLEOPTRATUS. Faun. Inf. germ.  
XXIV. 6.

Ist kein *Catheretes*, auch nicht das *Weibchen*  
des *C. pedicularius*, sondern eine Abänderung der  
*Silph. melanocephal.* Fn. Inf. germ. XXV. 5.

DERMESTES VIOLACEUS. Fn. Inf. germ. V. 6.

*Corynites violaceus*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 1. p. 285.

Hierher gehört allerdings *Schäffer Ic. Inf. ratisb.*  
tab. 166. fig. 4. a. b. Vergl. *meine systematische  
Nomenclat. der Schöff. Inf.* p. 152.

DERMESTES BIMACVLATUS. Fn. Inf. germ. LVII. 7.

Ein *Cryptophagus*, und eine sehr distinct aus-  
gezeichnete Art.

DERMESTES LONGICORNIS. Fn. Inf. germ. XXIII.  
10. ed. I.

*Dermestes fenestralis*. Faun. Inf. germ. XXIII.  
11. ed. II.

*Dermestes fenestralis*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 37. p. 318.

Vergl. Illig. Mag. I. n. 37. p. 385.

ANOBIVM RETICVLATVM. Fn. Inf. germ. XXXV. 7.  
*Anobium reticulatum*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 3. p. 322.

ANOBIVM MICANS. Fn. Inf. germ. X. 8.  
*Anobium micans*. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 14.  
p. 324.

Hicher gehört auch:

*Anobium festivum*. Fn. Inf. germ. VI. 7.

ANOBIVM NITIDVM. Fn. Inf. germ. X. 9.  
*Anobium nitidum*. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 15.  
p. 324.

Vergl. Illig. Mag. I. n. 15. p. 387.

ANOBIVM DENTICOLLE. Fn. Inf. germ. XXXV. 8.  
Ist eine eigene Art.

ANOBIVM DORCATOMA. Fn. Inf. germ. XXVI. 10.  
ed. II.

*Dermestes ferra*. Fn. Inf. germ. XXVI. 10.  
ed. I.

*Dorcatoma dresdense*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 1. p. 330.

Ent. Hefte II. p. 96. tab. III. fig. 10.

Es ist noch die Frage, ob das *Anobium Dorca-*  
*toma Illigeri*, welches gewis der hier abgebildete

Käfer

Käfer ist, (denn *Derm. Serra*, wie ich anfangs glaubte, ist es nicht) der nehmliche sey, den *Fabrizius* unten *Ptilinus dorcatoma* suppl. *Ent. syst.* p. 73. beschrieben, und den die *Verf. der entom. Hefte* abgebildet haben. Man vergleiche beider Beschreibungen, mit Herrn D. *Illigers* Beschr: des *Anob. dorcatom.* Kug. Käf. Pr. I. p. 334. und dieser meiner Abbildung.

PTINUS SEXPVNCTATUS. Fn. Inf. germ. I. 20.

Ist wohl doch nicht eigene Art. Eher eine Abänderung des *Männchens*, oder das noch ganz unvermischte Männchen selbst von *Ptinus fur F.* wohin auch *Schäffer* Ic. Inf. ratisb. tab. 155. fig. 3. a. zu gehören scheint.

HISPA MUTICA. Fn. Inf. germ. I. 8. ed. I.

*Ptilinus muticus.* Fn. Inf. germ. I. 8. ed. II.

*Sarrotrium muticum.* Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 1. p. 327.

PTILINUS ATER. Fn. Inf. germ. XXXV. 9.

*Ptilinus ferratus.* Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 5. p. 330.

PARNUS AVRICVLATUS. Fn. Inf. germ. XXXVIII. 23.

Eine standhaft verschiedene Art. In der Abbildung sind die Fühlhörner falsch, die wie am *Pern. prolifericornis* Fabr. und Fn. Inf. XIII. 1. gebildet sind. *Illiger.*

SILPHA RUGOSA. Fn. Inf. germ. V. 9.

*Silpha reticulata*, Fabric. Syst. Eleuth. 1. n. 18.  
p. 341.

Die richtigere *S. rugosa* ist Fn. Inf. XL. 17.  
abgebildet.

SILPHA MELANOCEPHALA. Fn. Inf. germ. XXV. 5.

Ist nicht *S. minuta* Fabr. weswegen dieses Citat  
selbst hinwegfällt, wie bereits vom H. Illig. im  
Mag. I. p. 392. sehr richtig erinnert worden ist.

SILPHA HEMIPTERA. Fn. Inf. germ. XXV. 6.

Ist eine eigene Art.

NITIDULA BILOBA. Fn. Inf. germ. XXXV. 10.

*Nitidula marginata*, Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 6. p. 348.

NITIDULA DISCOIDES. Fn. Inf. germ. LXXXIII. 5.

*Nitidula discoides*, Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 23. p. 352.

Ist keineswegs Abänderung der *Nit. haemorrhoid.* F. sondern eigene Art.

NITIDULA PUNCTATISSIMA. Fn. Inf. germ. XXV. 7.

Ist eine eigene Art.

HETERO CERUS MARGINATUS. Fn. Inf. germ. XXIII.

. cd. II.

*Heterocerus laevigatus*, Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 3. p. 356.

HETE-

HETEROCERVUS LAEVIGATUS. Fn. Inf. germ. XXIII.  
13. ed. II.

*Heterocerus marginatus*. Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 1. p. 355.

COCCINELLA ARGVS. Fn. Inf. germ. LXXIX. 4.

*Coccinella undecimmaculata*. Fabric. Syft.  
Eleuth. I. n. 67. p. 367.

COCCINELLA SCYMNVS QVADRIPIVSTVLATVS. Fn.  
Inf. germ. XXIV. 8. ed. 1.

*Coccinella bisbiverrucata*. Fn. Inf. germ. XXIV. 8.  
ed. II.

*Coccinella bisbipustulata*. Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 139. p. 382.

und zwar die var.  $\beta$ . *capite nigro, thorace utrin-*  
*que puncto rubro*. Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 6.  
p. 415.

COCCINELLA SCYMNVS. BIPVSTVLATVS. Fn. Inf.  
germ. XXIV. 10. ed. I.

*Coccinella humeralis*. Fn. Inf. germ. XXIV. 10.  
ed. II.

*Coccinella frontalis*. Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 133. p. 381.

*Coccinella frontalis* var.  $\delta$ . Illiger Kug. Käf.  
Pr. I. n. 8. p. 418.

COCCINELLA SCYMNVS NIGRINVS. Fn. Inf. germ.  
XXIV. 12. ed. I.

Cocci-

*Coccinella nigrina*. Fn. Inf. germ. XXIV. 12.  
ed. II.

*Coccinella nigrina*. Illiger Kug. Käf. Pr. I.  
n. 1. p. 413.

COCCINELLA BISBIPVSTVLATA. Fn. Inf. germ.  
XIII. 5.

*Coccinella quadrilunulata*. Illiger Kug. Käf.  
Pr. I. n. 7. p. 417.

*Sphaeridium quadrimaculatum*. Herbst Archiv  
IV. n. 6. p. 30. tab. 20. fig. 9.

Ich werde vielleicht nicht sehr irren, wenn ich unter dieser Bestimmung, den hier abgebildeten Käfer erkenne. Mehr, die etwas andrer beschriebene Lage und Direktion der Flecken, als die verschiedene Größe, erregen indessen dennoch Zweifel.

COCCINELLA AURORA. Fn. Inf. germ. XXXV. 5.

*Nitidula litura*. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 27.  
p. 353.

Vergl. Illig. Mag. I. n. 27. p. 394.

COCCINELLA AREATA. Fn. Inf. germ. XXIV. 7.

Halte ich immer noch für eine eigene Art. Mir ist sie seitdem nicht wieder vorgekommen.

COCCINELLA PUBESCENS. Fn. Inf. germ. XXIV. 13.

Führe ich auch gegenwärtig noch als eigene Art auf: wenigstens ist mir keine bekannt, an die sie sich schicken anreihen ließe.

CASSIDA THORACICA. Fn. Inf. germ. XXXVIII.

24.

*Cassida thoracica*. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 2.  
p. 388.

*Cassida thoracica*. Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 3.  
p. 478.

Vergl. Illig. Mag. I. n. 2. p. 404.

CASSIDA PVLCELLA. Fn. Inf. germ. XXXIX. 15.

*Cassida nobilis*. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 47.  
p. 396.

Vergl. Illig. Mag. I. n. 47. p. 407.

CHRYSOMELA PRETIOSA. Faun. Inf. germ. XLIV.

13.

*Eumolpus pretiosus*. Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 5. p. 419.

CHRYSOMELA GEMELLATA. Fn. Inf. germ. XLIV. 6.

*Chrysomela bicolor*. Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 39. p. 429.

Vergl. Illig. Mag. I. n. 39. p. 411.

CHRYSOMELA HAEMOPTERA. Faun. Inf. germ.

XLIV. 7.

*Chrysomela tristis*. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 62.  
p. 433.

CHRYSOMELA COLLARIS. Fn. Inf. germ.

LXXVIII. 2.

*Chry-*

*Chrysomela collaris*. Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 8. p. 435.

Schäff. Ic. Inf. ratisb. tab. 52. fig. 11. 12. ist *Clytra aurita* Fabric. und tab. 173. fig. 4. a. b. ist *Chrysomela Salicis* Fabric. Vergl. meine *system. Nomenclat. der Schäff. Inf.* p. 70. und p. 157.

CHRYSOMELA ALTERNANS. Fn. Inf. germ. LXVII.  
16.

*Chrysomela Megerlei*. Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 106. p. 439.

Vergl. *Illig. Mag. I.* n. 106. p. 414.

CHRYSOMELA SPECIOSA. Fn. Inf. germ. XXIII. 15.  
nur Abänderung von:

*Chrysomela gloriosa*. Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 111. p. 440.

*Chrysomela gloriosa*. Fn. Inf. germ. XXIII. 14.  
iedoch gehört Schäff. Ic. Inf. ratisb. tab. 21.  
fig. 8. nicht hieher. Vergl. meine *system. Nomencl.  
der Schäff. Inf.* p. 31.

CHRYSOMELA CARNIFEX. Fn. Inf. germ. XVI. 9.

*Chrysomela sanguinolenta*. Roff. Fn. Etrusc. I.  
n. 194. p. 77.

Geoffr. Inf. I. n. 8. p. 259.

*Chrysomela Rossia* Illiger.

Die *Chrysom. Carnifex* Fabric., welche er uns  
selbst bestimmt hat, ist eine länglichte. Die hier  
abge-



abgebildete, ist entweder unsere *Rossia*, oder eine andere noch unbeschriebene Art, *fimbriata nobis*, deren Halschild doch etwas breiter, und mehr gleichbreit ist, als in der Abbildung. Illiger.

Ich wählte demnach obige Benennung eher, da ich die *fimbriata* Illig. nicht kenne.

CHRYSOMELA BAADERI. Fn. Inf. germ. XXIV. 14,  
et LIX. 2.

ist nur *Abänderung* von

*Chrysomela viminalis*. Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 83. p. 436.

*Chrysomela viminalis*. Fn. Inf. germ. LXXVIII. 3.

CHRYSOMELA BECCABUNGAE. Fn. Inf. germ. XXV.  
11.

*Helodes violacea*. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 3.  
p. 470.

Um die Ueberficht der hier nun vorkommenden und zu berichtigenden *Alticar.* zu erleichtern, lasse ich solche nach dem Vorgange, mehrerer einsichtsvollen Entomologen, hier ungetrennt aufeinander folgen.

ALTICA NAPI. Fn. Inf. germ. XXI. 3.

*Chrysomela chrysocephala*. Linn. Syft. Nat. n. 53.  
p. 594.

*Altica Chrysocephala*. Ent. Heft. II. n. 13. p. 31.  
Tab. II. fig. 8. a. b.

Bey

Bey wiederholter genauern Untersuchung dieses hier vorgestellten Käfers, zeigte es sich, daß die *Verf. der Entom. Hefte*, sehr richtig beobachtet haben, und daß meine *Altica Napi* nicht die des Systems seye, dagegen unfreilig unter angezeigten Benennungen von denselben abgebildet und beschrieben, wie dies nicht nur die anschaulichere Größe, in Bezug auf die wahre *Altica Napi Fabr.*, sondern auch das so charakteristische hiemit zu vereinpaarende Merkmal des *gelben Gesichts* zu erkennen gab.

ALTICA HYOSCYAMI. Fn. Inf. germ. XXI. 4.

*Chrysomela Hyoscyami*. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 149. p. 447. exclus. Syn. Payk. et Geoffr.

Geoffr. I. n. 12. p. 149.

*Altica caerulea*. Ent. Hest. II. n. 31. p. 55.

Die *Verf. der Entom. Hefte* beschreiben, und bilden a. a. O. einen Käfer ab, den sie *Altic. Hyoscyami* nennen, und für die *Chrysom. Hyoscyami Linn.* halten, und von dem sie meine *Alt. hyoscyami* zu trennen suchen. So gerne ich aber einräume, daß meine *hyoscyami*, unter ihrer *caerulea*, so wie von *Payk. Fn. Succ. II. n. 15. p. 97.* richtig charakterisirt worden seye, so wenig kan ich mich überzeugen, daß ihre *hyoscyami*, diejenige seye, die *Linné* unter der feinen verstanden habe. Es ist kaum glaublich, daß

dafs *Linné* eine folche messingfarbige *Altica*, *totam caeruleam*, *corpore virescenti coeruleo*, und *ovatam caeruleam* *Fn. Suec. n. 536.* genannt haben würde. Bekanntlich variren diese kleinen *Altica* aus dem blauen öfters in das grünlichte, aber eine und die nehmliche Art nicht in das messingfarbige.

Wenn gleich die *Verf.* nur ihre *Altica* *Hyoscyami* auf dem Bilfenkraute fanden, die meinige aber nicht, so würde doch dieser Umstand kaum viel beweifen, indeme man als bekannt voraussetzen darf, dafs *Linné* so manche Insekten, in Schweden, auf Gewächsen antraf, auf welchen wir sie in Süddeutschland nicht finden. Uebrigens kan es möglich seyn, dafs *Linné* unter seiner *hyoscyami tota caerulea* eine andere vor sich hatte, als die ich hier abgebildet, doch wenigstens die *hyoscyami* der *Verf.* gewis nicht. Von dem *Fabrizischen* Citate abzugehen, fand ich keine Ursache.

*ALTICA NIGRIPES.* *Fn. Inf. germ. XXI. 5.*

*Chrysomela nigripes.* *Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 150. p. 447.*

*Altica Lepidii.* *Ent. Heft. II. n. 39. p. 64.*

Die *Verf. der Entom. Hefte* halten meine *Alt. nigripes*, nicht für die gleichnamige *Fabrizische*, weil *Fabrizius* in der *Ent. syst. II. p. 30.* sagt:  
*distin.*

*distincta* ab. *G. Hyoscyami pedibus nigris* — mit der sie (*die nigripes*) sich doch nicht vergleichen liesse. Jedoch verglich *Fabrizius* seine *Galleruca nigripes* nicht mit derienigen *hyoscyami*, welche die *Verf.* dafür annehmen, sondern mit einer Art, welche, um diesen Vergleich auszuhalten, seiner *nigripes* sehr ähnlich seyn müßte. Diese wäre doch wohl sehr wahrscheinlich alsdann meine *Altica hyoscyami*.

ALTICA HELXINES. Fn. Inf. germ. XXI. 6.

*Chrysomela Helxines.* Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 152. p. 447.

Ist eine von den am meisten übelgerathenen Figuren in der Fn. Inf. Kaum dafs man in ihr eine *Altica* erkennt. Ich werde solche künftig nochmals vorstellen lassen.

ALTICA MODEERI. Fn. Inf. germ. XXI. 7.

*Chrysomela Modeeri.* Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 155. p. 448.

*Altica Modeeri.* Ent. Heft. II. n. 24. p. 47.

ALTICA TESTACEA. Fn. Inf. germ. XXI. 13.]

*Chrysomela testacea.* Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 159. p. 448.

*Altica testacea.* Ent. Heft. II. n. 27. p. 50.

ALTICA RUFIPES. Fn. Inf. germ. XXI. 10.

*Crioceris fulvipes*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 68. p. 463.

*Altica fuscicornis*. Ent. Heft. II. n. 28. p. 51.

Nach der Meinung der *Verf. der Entom. Hefte* gehört *Chrysom. fuscicornis* Linn. S. N. n. 66. hieher. Nur sagt Linné: *paullo maior*; nehmlich, als seine *Chrysom. rufipes* n. 65. oder meine *Altica ruficornis*, das den Gedanken erregt, Linné müfse keine sehr grofsen Exemplare von seiner *Chr. fuscicornis* gesehen haben, deren es doch gibt, und die noch gröfser find, als selbst das auf Tab. 13. Fn. angegebene Gröfsenmaafs, ganz einstimmig, mit der *Verf.* eigenen Angabe, von  $1\frac{1}{2}$  bis 2 Linnien: auch sagt Linné: *nec antennae lurcae*; aber auch dies trifft kaum zur Helfte zu: die ersten fünf Gelenke geht dies nur an: nicht minder erregt das *simillima rufipedi*, doch auch einige Bedenklichkeiten. Linné hat auch diese *Chrysom. fuscicornis* zu kurz behandelt, um mit voller Evidenz zu entscheiden. Indessen gehört solche doch weit eher hieher, als zur *Crioc. ruficorn.* Fabric.

In den *Ent. Heften* mufs bey dieser *Alt. fuscicornis* n. 28. statt *Crioceris fulvicornis* Fab. Syst. Eleuth. I. 465. — *Crioceris fulvipes* Fab. Syst. Eleuth. I. 463. gelesen werden.

ALTICA FUSCIPES. Fn. Inf. germ. XXI. 11.

*Crioceris fuscipes*. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 69.  
p. 464.

*Altica fuscipes*. Ent. Heft. II. n. 1. p. 10.

Die Punktreihen auf den Flügeldecken, sind gegen hinten zu, nicht mehr so regelmäfsig, wie an ihrem Entflehen, worauf das *punctis subdispersis*, Ent. H. l. c. sehr treffend anpricht. Fabricius sagt: *affinis praecedenti, et forte eius varietas*, welches seyn dürfte, wenn man annehmen kan, das die Verf. der Ent. Hefte, und ich einen ganz andern Käfer, als *diese fuscipes*, vor sich gehabt hätten.

ALTICA RUFICORNIS. Fn. Inf. germ. XXI. 12.

*Crioceris ruficornis*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 70. p. 464.

*Altica rufipes*. Ent. Heft. II. n. 2. p. 11.

Der Quereindruck auf dem Bruststücke, den die Verf. d. Ent. Hefte zu einem charakterisirenden Umstand bey diesem Flehkäfer erheben, mus indessen bey manchen Exemplaren doch sich sehr abflächen, wenigstens bemerke ich solchen nicht in den beschriebenen Stücken. Nur sind die an Hinterrande des Halschildes stehenden beyden Grübchen deutlich. Wenn angenommen werden dürfe, das die *Altica rufipes* Fn. auch mit *rothen Füßen* abändern könne, woran es mir jedoch  
ganz

ganz an Erfahrung gebricht, um diese kühne Idee zu verfolgen, so würde ich mich überzeugen, daß *Altica ruficorn. Fn.* nur Spielart der gedachten rufip. seye: so ähnlich sind meine Exempl. beyder Arten, einander.

CRIOCERIS QUADRIPUSTULATA. Faun. Inf. germ. LXXXVIII. 2.

*Crioceris quadripustulata.* Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 72. p. 464.

*Altica quadripustulata.* Ent. Hest. I. n. 43. p. 73.

Die *Crioceris quadripustulata* Fabr. soll, besage des *System. Ent.* n. 13. p. 114, wofelbst solche zuerst als *Altica quadripustulata* aufgeführt worden ist, *magnitudinem Alt. rufiped.* (Fn. XXI. 10. *Alt. fuscicorn.* Ent. Hest II. n. 28.) haben; allein diese Gröfse hat weder die *Alt. quadripust. der Ent. Hefte*, noch meine *C. quadripust.*, aber das vom *Geoffr.* I. n. 15. p. 250. von dem solche *Fabrizius* zuerst entlehnte, angegebene Gröfßenmaafs; von  $1\frac{1}{2}$  Linien trifft zu. Ferner sagt *Fabrizius* a. a. O. *punctum alterum elytrorum ad basin, alterum versus apicem*; aber weder der *Verf. der Ent. Hefte*, noch mein Käfer, haben *puncta* (wiewohl *Fabrizius* solche nachgehends in der *Ent. Syst.* II. n. 93. in *lineolas* verwandelt), eben so wenig als *lineolas*. Beider Käfer farbichte Flügeldecken Zeichnungen müfste man *maculae* nennen.

nen. Solchemnach dürfte diese *Fabriziusche Altica*, weder die meinige noch jene in den *Ent. Heften* beschriebene und abgebildete seyn. Aber auch unsere beiden Käfer sind sich sehr ungleich; dieß gibt schon die Ansicht beider Abbildungen zu erkennen. Mein Käfer hat auf ieder Flügeldecke zwey dunkelrothrothe länglichtrunde *Flecken*, deren einer hart an der Schulter, (nicht als *lineola discoidalis*, wie *Paykull* *Fn. Suec.* II. n. 18. p. 99. will) und der andere, in einiger Entfernung von den Endspitzen liegt: da hingegen diese Flecken, bey der *Alt. quadripustul. der V.* tab. III. fig. 5. nicht nur ganz anderst situirt, sondern von Farbe, *weißlicht* oder *bleich* (*albidae, pallidae*) sind, ob sie gleich *fulvae*, und *röthlich gelb* von den *Verf.* genennet werden.

Die Gröfse des *Paykullfchen Käfer* a. a. O. soll *duplo minor praecedente* (nehmlich *Alt. nemor.*) seyn: meine Exemplare der *Crioc. quadripust. Fn.* die ich in großer Anzahl jährlich auf *Cynogloss. officinal. Linn.* finde, haben die Gröfse, mit der *Alt. nemor.* gemein.

Ich kan daher kaum glauben, daß ich die alte *Altica quadripust. Fabr.* oder diese izige *Crioc. quadripust.* abgebildet habe; noch weniger, daß die *Alt. quadripustul. der Entom. Hefte*, mit dem *Fabriz.* eben genannten Käfer, noch mit meinem

ver-



verglichen werden könne. Meiner Meinung nach sind hier drey verschiedene Arten zur Sprache gebracht:

1. *Crioceris quadripustulat.* Fabr. l. c. wohin Geoffr. I. n. 15. p. 250. gehört.
2. *Altica quadripustulata* Ent. Heft. I. l. c. wohin Galler. *quadripustul.* Paykull. l. c. gehört.
3. *Crioceris quadripustul.* Fn. Inf. germ. l. c. wozu ich bis itzt kein Synonym kenne.

Noch muß ich bemerken, daß an alten Exempl. meiner *Crioc. quadripust.* die *antennae* nur basi flavescens sind, ob sie gleich in der Abbildung, irrig, ganz gelblich illuminirt worden.

ALTICA NASTURTI. Fn. Inf. germ. XXI. 9. exclus. Syn. Fabric.

*Altica flexuosa* var. a. Entom. Heft. II. n. 42. p. 71.

Mit dieser verbinden die achtungswürdigen Verf. der Ent. Hefte sehr zweckmäfsig, und wie ich glaube, ganz mit Einverständnis der Natur selbst, die

*Altica flexuosa.* Fn. Inf. germ. XXV. 12.

*Altica flexuosa* var. b. Ent. Heft. II. n. 42. p. 71.

Nur fällt ihre var. c. *Altica flexuosa* Hellw. darum hinweg, weil solche die nehmliche hier

abgebildete *Altica flexuosa* Fn. et var. b. ist, die mir vom Herrn Prof. Hellwig hiezu mitgetheilt, und die vorher vom Herrn D. Illiger, in dem angeführten *Schneiderischen* Mag. V. 8. 601. beschrieben worden ist. So nach würden sonst aus einer — zwey entstehen!

ALTICA ATRICILLA. Fn. Inf. germ. XXI. 8.

*Altica affinis*. Ent. Hest. II. n. 16. p. 35.

*Chrysomela exoleta*. Linn. Syft. Nat. n. 59. p. 594. et Fn. Succ. n. 541.

Auffer der Differenz, des vom *Linné* in der Fn. Succ. gebrauchten *faltatoria flavescens*, und des im Syft. Nat. nachher ungetauchten *faltatoria livida*, die sich wohl vereinbaren läßt, sehe ich keinen Grund ab, mit *Paykull* Fn. Suec. II. p. 109. zu behaupten, daß *Linné* zwey ganz verschiedene Arten, so überaus oberflächlich angenommen und distinguirt haben sollte. Nur die *Crioceris exoleta* *Fabric.* gehört nicht hieher, wie schon *Illiger* Mag. I. p. 420. sehr richtig bemerkt hat, denn diese ist folgende:

ALTICA EXOLETA. Fn. Inf. germ. XXI. 14.

*Crioceris exoleta*. *Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 80. p. 466. *exclus. Syn. Linn.*

*Altica exoleta*. Ent. Hest. II. n. 5. p. 17. *exclus. Syn.*

ALTIS

ALTICA TABIDA. Fn. Inf. germ. XXI. 15.

*Crioceris tabida*, Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 86.  
p. 467.

Vergl. *Ent. Hefte II.* n. 49. p. 86. wofelbst diese tabida Fn. (warum nicht auch tabida Fabric?) für eine bloße *Spielart* der Chrysom. atricill. Linn. erklärt wird, und wie ich glaube mit Recht.

ALTICA NEMORVM. Fn. Inf. germ. XXI. 19.

*Crioceris nemorum*, Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 89. p. 467.

*Altica nemorum* Ent. Hest. II. n. 41. p. 70.

ALTICA BRASSICAE. Fn. Inf. germ. XXI. 18.

*Altica Spartii*. Ent. Hest. II. n. 45. p. 76.

Die achtungswürdigen Verf. der *Ent. Hefte* urtheilen nur zu richtig, daß dieser Käfer keineswegs unter die Alticas gehören könne, und zur vollkommenen Bestätigung Ihres Urtheiles, lasse ich hier Herrn D. Illiger, nach dem mir hierüber gefälligst mitgetheilten, selbst sprechen:

Die *Altica Brassicae* Fn. &c. ist unsere *Galleruca futurella*, die wir aus Süddeutschland und Ungarn bekommen haben; und wovon *Crioceris pinicola* Anderesch. Catalog. vienn. nur Abänderung zu seyn scheint. In den Entom. Heften ist dieser Käfer als *Haltica Spartii* II. 76. 45. beschrieben. Da er aber  
keine

keine *Haltica* ist, sondern zu der Familie von *Galleruca* gehört, welche *Fabrizius Crioceris* nennt, so ist unser schon lang gegebener Name, wohl besser. Die Citate des *Fabrizius* (nehmlich in der *Fn.*) sind falsch. Die *Alt. Brassicae Fabr.* ist ein sehr verschieden gezeichnetes kleines Käferchen.

*ALTICA PRATENSIS.* *Fn. Inf. germ. XXI.* 16.

*Geoffr. Inf. I.* 19. p. 251.

*Altica pratensis.* *Ent. Heft. II. n. 50.* p. 88.

Hiermit scheinen auch die Verf. dieser *Entom. Hefte*, die *Crioceris Nasturtii Fabric.* verbinden zu wollen, die wie nun ersichtlich, nicht die von mir *Fn. Inf. XXI.* 9. vorgestellte ist, und theilen von derselben *Tab. III. fig. 9.* eine sehr vorzügliche Zeichnung mit. Es kan seyn, das diese *nasturtii* nach einer von mir noch nicht beobachteten Stufenfolge, aus dieser *pratensis Ent. Hefte* entstehen könne, nur glaube ich kaum, das meine sich so sehr in Bau, und Umriss des Körpers und Farbe auszeichnende *pratensis*, mit iener vereint werden könne, vielmehr, da ihr mehrere an der *pratensis* prätirte Eigenheiten, wie — pechschwarze Hintersehenkel fehlen, von derselben entfernt gehalten werden mögte.

ALTICA VERBASCI, Fn. Inf. germ. XXI. 17.

Vergl. *Ent. Hefte II.* n. 48. p. 84. wofelbst diefe Verbasci mit Crioc. Sifymbrii *Fabr.* zu vereinigten verfucht wird. Diefs wird aber wohl nicht füglich angehen können, da mich ein wiederholter Vergleich, mit dem vom Herrn Prof. *Hellwig* felbst gefälligft mitgetheilten Exemplare, und mit der noch beftehenden *Fabriz.* Beschreib. fattfam überzeugt, dafs felbige nicht auf gegenwärtige Verbasci gedeutet werden kan, wofür diefe gut gerathene nur zu lebhaft ausgefallene Abbildung felbst das Wort fpricht: ausserdem Herr D. *Illiger*, den ich um fein Gutachten hierüber gefragt, noch immer der ältern hellwigifchen Distinktion, getreu zu bleiben, angerathen.

ALTICA GRAMINIS. Fn. Inf. germ. LXI. 4.

*Altica Graminis.* Ent. Heft. II. n. 25. p. 47.

ALTICA ORBICVLATA. Fn. Inf. germ. VIII. 6.

Gehört nicht unter *Altica*, fondern unter *Cyphon*, und beftimmt eine eigene mit dem *Cyph. hemiph.* F. Faun. XCVI. 7. nicht zu verwechfelnde Art.

ALTICA GLOBOSA. Fn. Inf. germ. XXV. 13.

Beftättigt fich als eigene Art.

ALTI-

ALTICA ERVCAE. Fn. Inf. germ. XXI. 2.

Ist, wie die genau beobachtenden Verf. der *Ent. Hefte II.* p. 55. bereits sehr richtig bemerkt haben, nur die (übelgerathene) Chrysomela Cochleariae Fabric. welche Fn. Inf. XLIV. 15. nochmals, jedoch um vieles besser, vorkommt.

CRIOCERIS GLABRATA. Fn. Inf. germ. XXXIV. 6.

*Crioceris glabrata.* Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 28. p. 455.

Vergl. *Illig.* Mag. I. p. 418. 419. wofelbst solche für eine Abänderung der Crioc. Cerasi, oder fulvicollis gehalten wird.

CRIOCERIS FULVICOLLIS. Fn. Inf. germ. LXXXIII. 8.

*Crioceris Cerasi.* Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 30. p. 56.

Vergl. *Illig.* Mag. I. n. 30. p. 418.

CRIOCERIS LINEOLA. Fn. Inf. germ. XXXIV. 5.

*Crioceris lineola.* Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 62. p. 462.

Auch diese wird a. a. O. von Herrn D. *Illiger* für eine bloße Spielart der Crioc. Cerasi erklärt. — Auf einer eingezäunten tief liegenden Waldwiese, die durch einen vorbeystießenden Waldstrom immer feucht erhalten wird, finde ich jährlich die *Crioceris Cerasi* Fabr. auf *Chaeroph. sylve-*

fylvestre u. hirsut. Linn. in großer Menge: aber auch nicht *einmal* noch, traf ich die darunter gerechneten Varietäten Crioc. glabrata und lincola, unter selbiger an. —

CRIOCERIS PHELLANDRYI. Fn. Inf. germ. LXXXIII. 9.

*Helodes Phellandryi*. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 1. p. 469.

CRIOCERIS CAMPESTRIS. Fn. Inf. germ. III. 12.

*Helodes campestris*. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 2. p. 470.

Ich bitte hierüber nachzulesen: Voet etc. IV Th. p. 22. meiner Ausgabe.

CRIOCERIS MERDIGERA. Fn. Inf. germ. XLV. 2.

*Lema merdigera*. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 9. p. 472.

CRIOCERIS BRUNNEA. Fn. Inf. germ. XLV. 1.

*Lema brunnea*. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 11. p. 473.

CRIOCERIS DUODECIMPUNCTATA. Fn. Inf. germ. XLV. 3.

*Lema duodecimpunctata*. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 12. p. 473.

CRIOCERIS QUATVORDECIMPUNCTATA. Faull. Inf. germ. XLV. 4.

*Lema quatuordecimpunctata*. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 14. p. 473.

CRIOC-

**CRIOCERIS BIMACULATA.** Fn. Inf. germ. XLVIII. 16.

*Galleruca quadrimaculata.* Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 36. p. 485.

**CISTELA FVSCA.** Fn. Inf. germ. XXV. 19.

*Cistela rufipes.* Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 12. p. 19.

**CISTELA RVBRICOLLIS.** Fn. Inf. germ. XXXIV. 9.

*Cistela thoracica.* Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 16. p. 19.

**CISTELA BIPVSTVLATA.** Fn. Inf. germ. XXV. 15.

*Cistela humeralis.* Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 18. p. 19.

**CISTELA BREVIS.** Fn. Inf. germ. XXV. 17.

*Cistela maura.* Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 21. p. 20.

wohin auch *Helops picipes* Faun. Inf. germ. XXIV. 4. als Abänderung gehört.

**CISTELA HVMERALIS.** Fn. Inf. germ. XXV. 14.

*Cistela scapularis.* Illig.

*Ich halte die von mir im Schneid. Mag. und von Ihnen Fn. Inf. 25. 15. beschriebene Cistela bipustulata für die wahre Cist. humeralis Fabric. Ist dies richtig, so muss ihre C. humeralis den Namen annehmen, den wir ihr in unserer Sammlung ertheilt haben, Cistela scapularis. Illiger.*

CISTE-



CISTELA LINEARIS. Fn. Inf. germ. XXV. 16.

Ist eine eigene Art.

CISTELA OPACA. Fn. Inf. germ. XXV. 18.

*Allecula Morio*. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 1.  
p. 21.

Vergl. *Allecula Morio* Fn. Inf. germ. XCV. 1.  
Die nehmliche Art, nur aus Versehen nochmals  
abgebildet.

CISTELA ANTENNATA. Fn. Inf. germ. LVII. 8.

Mir bis izt noch eine eigne Art.

CISTELA LAETA. Fn. Inf. germ. VIII. 8.

*Cyphon pallidus*. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 1.  
p. 501.

CISTELA FALLIDA. Fn. Inf. germ. VIII. 7.

*Cyphon lividus*. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 2.  
p. 501.

CISTELA NIMBATA. Faun. Inf. germ. XXIV. 15.

*Cyphon marginatus*. Fabric. Syft. Eleuth. I.  
n. 5. p. 502.

CLYTHRA HUMERALIS. Fn. Inf. germ. XLVIII. 13.

*Clythra tridentata*. Fabric. Syft. Eleuth. II.  
n. 27. p. 34.

Schäffer Ic. Inf. Ratisb. tab. 77. fig. 5.

Vergl. meine *system. Nomencl. der Schöff. Inf.*  
n. 5. p. 92.

CLYTHRA LONGIMANA. Fn. Inf. germ. XLVIII. 14.

*Chrysomela tridentata*. Linn. Syst. Nat. n. 73. p. 596.

Schäffer Ic. Inf. Ratisb. tab. 36. fig. 13.

Vergl. *Illig. Mag.* III. n. 27. p. 164. und meine *system. Nomenclat. der Schäff. Inf.* n. 13. p. 52.

CLYTHRA TRIDENTATA. Fn. Inf. germ. XLV II. 12.

*Clythra longimana*. Fabric. Syst. Eleuth. II.

n. 40. p. 37.

Vergl. *Illig. Mag.* III. n. 40. p. 165.

CLYTHRA SCOPOLINA. Fn. Inf. germ. XLVIII. 15.

Vergl. *Illig. Mag.* III. n. 38. p. 164. nach welchem diese *Clythra Scopolina* für die *Chrysomela quadrimaculata Linn.* erklärt, und demnach von *Clythra Scopolina* und *Clythra quadrimaculata Fabric.* für verschieden gehalten wird. Nur kann ich nicht einräumen, daß *Schäff. Ic. Inf. ratisb. tab. 6. fig. 6. 7.* für *Clythra Scopolina Fabric.* gehalten wird. Man vergleiche meine *system. Nomenclat. der Schäff. Inf.* n. 6. 7. p. 9.

CLYTHRA AFFINIS. Fn. Inf. germ. XXV. 21.

Als eine eigene selbstständige Art von Herrn D. *Illiger* aufs neue erklärt.

CRYPTOCEPHALVS MORAEI. Fn. Inf. germ. LXVIII.

11.

*Cryptocephalus Moraei*. Fabric. Syst. Eleuth. II.

n. 61. p. 52.

Schäff.

Schäff. Ic. Inf. ratisb. tab. 238. fig. 2. gehört nicht hieher: vergl. meine *system. Nomenclat. der Schäff. Inf.* n. 2. p. 196.

CRYPTOCEPHALVS VITIS. Fn. Inf. germ. LXVIII. 5.

Ist eine Abänderung von *Cryptoceph. Coryli Fabr.*

CRYPTOCEPHALVS OBSCURVS. Fn. Inf. germ. V. 12.

*Eumolpus obscurus.* Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 19. p. 421.

CRYPTOCEPHALVS ARENARIVS. Faun. Inf. germ. XXXIX. 19.

*Eumolpus arenarius.* Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 26. p. 423.

HISPA BIPUSTVLATA. Fn. Inf. germ. XLIII. 17 — nicht 34. 17.

*Hispa bipustulata.* Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 6. p. 59.

Zwar allerdings die nehmliche *Fabriz* Art, die aber richtiger, nach Herrn D. *Illigers* Dafürhalten, unter *Dasytes* zu stehen kommt. Hieher gehört auch: *Melyris bipustulatus Rossi* Fn. Etr. I. 35. 86. tab. 7. fig. 14.

DRYOPS SVTVRALIS. Fn. Inf. germ. XLV. 12.

Ist wohl kein *Dryops*: mit mehr Recht kan diese Art den *Serropalpis* einverleibt werden. Ich finde feiner nirgends gedacht.

LAGRIA.

LACRIA FLAVIPES. Fn. Inf. germ. VI. 11.

*Dasytes pallipes*. Illig.

*Melyris pallipes*. Illig. Mag. I. p. 83.

LYTTA ERYTHROCEPHALA. Fn. Inf. germ. XLI. 6.

Ist nicht die wahre *L. erythrocephala Fabric.* und *Pallas*, die nicht in Deutschland zu Hause ist: die gegenwärtig hier abgebildete, muß in der Folge also bestimmt werden:

*Lytta verticalis*. Illiger.

*Lytta erythrocephala* Roffi Fn. Etruf. I. n. 593.  
p. 291.

*Cantharis dubia*. Oliv. Inf. 46. tab. I. fig. 7.

Lezteres Synonym führt *Fabricius* bey seiner *Lytta dubia*, wiewohl mit Unrecht an. Vergl. *Illig. Mag. III. p. 172.*

MYLABRIS FVESLYNI. Fn. Inf. germ. XXXI. 18.

*Mylabris Cichorei*. Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 2. p. 81.

LYMEXYLON NAVALE. Fn. Inf. germ. XXII. 5.

*Lymexylon navale*. Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 4. p. 88.

*Schäffer* Icon. Inf. ratisb. tab. 59. fig. 1. gehört nicht hieher: vergl. meine *System. Nomencl. der Schöff. Inf. n. 1. p. 77.*

LYMEXYLON BARBATVM. Fn. Inf. germ. XXII. 4.

ed. I.

*Dircaea barbata*. Faun. Inf. germ. XXII. 4.  
ed. II.

*Lymexylon Morio*. Fabric. Syft. Eleuth. II.  
n. 6. p. 88.

Der Grund, der in der zweiten Auflage meiner Faune von mir vorgenommenen Reformation der Nomenclatur dieses Käfers, lag in den eigenen Aeufferungen des Herrn D. *Illigers* — (Kug. Käf. Pr. I. n. 7.) welchen zu Folge ich glauben mußte, das das damals mir vom Herrn Prof. *Hellwig* in Braunschweig zum Gebrauch für die Faune, gefälligst mitgetheilte Exemplar dieses Käfers, daselbe des *Lymexylon barbatum* Fabric. Ent. syft. II. n. 4. p. 92. und kein anderes seye. Zu meiner Verwunderung sehe ich nun (*Illig. Mag. III. n. 6. p. 174.*) das dieses sich nicht also verhalte, und das dieses vermeintliche *Lymexylon barbatum* Fn. I. c. nicht die *Dircaea barbata* Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 1. p. 88. seyn dürfe, sondern nur eine bloße Geschlechtsverschiedenheit von dem *Lymexyl. dermestoides* Fabric. und Faun. Ich weiche sehr gerne dieser neuern Bestimmung, um so mehr, da ich durch die Zurücksendung dieses *Lymexyl. barbatum* Fn. außer Stand gesetzt bin, hierüber etwas mehr, als den Grund meiner vorgenommenen Veränderung der ältern Nomenclatur vorzulegen und anzugeben.

Gleich

Gleichwohl muß *Schäff.* Ic. Inf. Ratisb. tab. 66. fig. 1. bey allen Lymexyl. und Dircaeis wegfal-  
len, weil dafelbst nichts anders, als *Tenebrio Mo-*  
*litor Fabr.* vorstellig gemacht worden ist. Vergl.  
meine *Syst. Nomenclat. der Schäff. Inf.* n. 1. p. 83.

LYMEXYLON FLABELLICORNE. Fh. Inf. germ. XIII.  
10.

Eine eigene Art, die im Preussischen vor-  
kommt.

LYMEXYLON LAEVIGATVM. Fh. Inf. germ. XXIV.  
16. ed. I.

*Dircaea discolor.* Faun. Inf. germ. XXIV. 16.  
ed. II.

*Dircaea discolor.* Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 2.  
p. 89.

Der hier abgebildete Käfer ist gewis nichts an-  
ders, als der hier genannte. Die Beschreibung  
des Herrn D. *Illigers* seines *Serropalpus laeviga-*  
*tus* Kug. Käf. Pr. I. n. 8. p. 131. trifft vollkommen  
zu. Jedoch muß ich bemerken, daß diese Fi-  
gur, wohl größtentheils, und zumal durch Zu-  
that der *Illuministen*, mißrathen ist. Die vor  
mir liegende Mahlercy des Herrn *Sturms* ist der  
Natur viel getreuer, in welcher wenigstens gar  
keine *Streifen* auf der Flügeldecke zu sehen sind.  
Aufferdem ist das Bruststück falsch illuminirt, es  
soll keineswegs metallgrün seyn, auch die Farbe  
der

der Flügeldecken ist verfehlt, sie ist viel zu hell. Die Fufsblätter find auch verfehlt, fo wohl der Zahl ihrer Glieder, als ihrer verhältnismäfsigen Proportion nach. In dem 97 Hefte habe ich eine richtigere Abbildung veranstaltet.

HALLOMINVS VNDATVS. Fn. Inf. germ. LXVIII.  
23.

Da ich diefen Käfer nicht mehr beize, fo bin ich auſſer Stand, über deſſen ſpecificiſche Identität ſo wenig, als über deſſen generiſche Dignität etwas zu äuffern. Nur mit groſſer Wahrſcheinlichkeit kan er unter den *Direacis* eingereiht werden: ob unter den *faltatoriis*,? kan ich gar nicht entſcheiden.

HALLOMINVS PURPUREVS. Fn. Inf. germ. LVII. 22:  
und

HALLOMINVS TESTACEVS. Fn. Inf. germ. LVII. 23.

Herr D. *Illiger* hält ſie für Arten unter *Catops* gehörig: das wohl möglich ſeyn kan. Ich beize beide nicht mehr.

CUCUVS BIPYSTVLATVS. Fn. Inf. germ. IV. 13.

Nur eine Abänderung von *Cucuius monilis Fabric.*

RIPIPHORVS CARINTHIACVS. Faun. Inf. germ. XXII. 7.

*Ripiphorus lituratus. Fabric. Syſt. Eleuth. II. n. 14. p. 120.*

Vergl. *Illig. Mag.* III. n. 14. p. 177. Dieser *Fabriz. R. lituratus* sey eine Abänderung von *R. bimaculatus* F.

**RIPIPHORVS ANGVLATVS.** Fn. Inf. germ. XC. 3.

Ist das *Weibchen* vom *Rip. paradoxus Fabr.* Kommt nach Herrn D. *Illigers* Versicherung auch auf dem Harze vor.

**MORDELLA DORSALIS.** Fn. Inf. germ. XIII. 15.

*Mordella variegata.* Fabric. *Syst. Eleuth.* II. n. 5. p. 122.

**MORDELLA NEUWALDEGGIANA.** Faun. Inf. germ. XXXVI. 8.

*Mordella brunnea.* Fabric. *Syst. Eleuth.* II. n. 18. p. 123.

---

Ohngeachtet die nun folgenden *Donaciae*, bereits in der *zweiten Auflage* des neun und zwanzigsten Heftes der *Faun. Inf.* rucksichtlich, auf die, so wohl in der *A. L. Z. Nr. 143. p. 323.* als in dem *Illigerschen Mag.* III. p. 178. mitgetheilten **Bemerkungen**, berichtet worden sind, so will ich jedoch solche auch hier anschließen, um theils keine Lücke zu lassen, theils solche denjenigen Besitzern der *Faun. Inf.* mitzutheilen, welche diese zweite Auflage noch nicht in Händen haben.

DONACIÆ



**DONACIA STRIATA.** Fn. Inf. germ. XXIX. 1.

*Donacia crassipes.* Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 1.  
p. 126.

**DONACIA DISCOLOR** Mas. Fn. Inf. germ. XXIX. 3.

*Donacia discolor* Fem. Fn. Inf. germ. XXIX. 4.

*Donacia sericea.* Illiger.

*Leptura sericea.* Linn. Syst. Nat. n. 8. p. 638.

*Leptura sericea.* Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 64.  
p. 365.

Vergl. Illig. Mag. III. n. 4. p. 179.

**DONACIA PALVSTRIS.** Fn. Inf. germ. XXIX. 10.

*Donacia nigra.* Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 9.  
p. 128.

**DONACIA CLAVIPES.** Fn. Inf. germ. XXIX. 13.

*Donacia Menyanthidis.* Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 14. p. 129.

**DONACIA SEMICYPREA.** Faun. Inf. germ. XXIX.  
14.

*Donacia simplex.* Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 13.  
p. 129.

**DONACIA SIMPLEX.** Fn. Inf. germ. XXIX. 15.

*Donacia linearis.* Hoppe Elytr. erl. p. 46. tab. 1.  
fig. 10.

**MELOLONTHA FLORICOLA.** Fn. Inf. XLVII. 17.  
exclus. Syn. Fabric.

*Melolontha austriaca.* Herbst Archiv. IV.  
n. 22. p. 16. tab. 19. fig. 26.

Die Melolon. floricol. Fabric. stellt diese Abbildung nicht vor, sondern nur die *Mel. austriaca Herbst.*, die von der floricola ganz verschieden ist, weswegen auch das *Herbst'sche* Citat, bey *Fabric.* wegfallen muß.

MELOLONTHA FRUTICOLA. Fn. Inf. XLVII. 16.

*Melolontha fruticola.* Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 94. p. 176.

Ist nur das *Weibchen* der frutic. wiewol nicht zum besten gerathen, weswegen man solches leicht, für eine Abänderung der *Mel. agricola*, die es nicht ist, ansehen konnte.

MELOLONTHA FARINOSA. Fn. Inf. germ. XXVIII.  
16.

*Melolontha farinosa.* Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 99. p. 177.

*Hoplia caerulea.* Illig.

Hierher gehört auch *Melol. caerulea Herbst.* Nat. d. K. etc. und *Mel. squamosa Oliv.* aber keineswegs *Scarab. farinosus Lin.* welches Citat bey dieser *Mel. farinosa* auszustreichen ist.

MELOLONTHA SQVAMOSA. Fn. Inf. germ. XXVIII.  
17.

*Melolontha squamosa.* Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 100. p. 177.

*Hoplia*

*Hoplia squamosa*. Illig.

Nach Herrn D. Illigers Meinung scheint der Scarab. farinosus Linn. nur eine Abänderung dieser Mel. squam. zu seyn.

MELOLONTHA ARGENTEA. Fn. Inf. germ. XXVIII. 18.

*Melol. pulverulenta*, Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 105. p. 178.

*Hoplia pulverulenta*. Illig. Mag. II. p. 229.

Diese ist nicht die Melol. argentea Fabric. welche nun für eine Abänderung der Hoplia squamosa Illig. vom Herrn D. Illiger gehalten wird, sondern dessen *Hoplia pulverulenta*. Zu ihren Abänderungen gehört *Mel. pulverulenta Fabric.* jedoch mit Ausschließung aller von ihm angeführten Citaten.

MELOLONTHA GRAMINICOLA. Faun. Inf. germ. XXVIII. 19.

*Melolontha graminicola*. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 106. p. 179.

*Hoplia graminicola*. Illig.

Ist eine eigene sonst mit keiner bekannten ähnlichen zu verwechselnde Art. Das irrige Citat bey Fabricius *Herbst. Archiv. tab. 25. fig. 3.* ist in *Herbst. Nat. d. Käf. III. n. 71. tab. 25. fig. 3.* zu verbessern.

MELOE

MELOLONTHA PULVERULENTA. Faun. Inf. germ.  
XXVIII. 20.

*Hoplia minuta*. Illig.

Diese ist nicht *Melol. pulverulenta Fabric.* eher vielleicht *Mel. pulverul.* Herbst. Man trifft sie, nach Herrn D. Illigers Versicherung auch im Preussischen an.

MELOLONTHA CHRYSOMELOIDES. Fn. Inf. germ.  
XXXIV. 11.

*Melolontha chrysomelina*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 108. p. 179.

*Scarabaeus chrysomeloides*. Sturm ent. Handb. I. n. 56. p. 62.

Obgleich die wahre *Mel. chrysomel. Fabr.* — wenn schon nicht unter *Melolontha* gehörig, hier vorgestellt worden ist, so denn noch nicht, *Scarab. chrysomeloides Schrank*, der unstreitig einerley mit *Melolontha variabilis Fabric.* ist. Vergl. *Schranks* Fn. boic. I. 2. p. 412.

BUPRESTIS PRUNI. Fn. Inf. germ. XXIX. 21.  
ed. I.

*Buprestis undata*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 109. p. 206.

BUPRESTIS APPENDICULATA. Faun. Inf. germ.  
LXVIII. 22.

*Buprestis appendiculata*. Fabric. Ent. Syst. II. n. 102. p. 210.

*Bupre-*

*Buprestis Morio*. Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 133. p. 210.

Demohngeachtet, wenn gleich diese Abbildung, *Elytra apice ferrulata* anzeigt, und *Fabrizius* solche unter die Arten mit *elytris integris* stellt, ist diese genannte Art hier vorgestellt, die, wie mich ein wiederholter Vergleich, mit meinen *Exemplaren* und dieser Abbildung belehrte, allerdings, jedoch nur sub oculo bene armato, an der Spitze, wiewohl noch höher am äußern Rande der Flügeldecken hinauf, solche ungemein zarte Einzählungen hat.

*Paykull*. Fn. Suec. II. n. 17. p. 230. gehört hier, dessen Beschreibung vollkommen zutrifft.

BUPRESTIS HYPERICI. Fn. Inf. germ. LXVII. 18.

Ist eine eigene Art, aber nicht *B. elata Fabric.*  
Diese ist folgende:

BUPRESTIS SINVATA. Fn. Inf. germ. XXXV. 13.

*Buprestis elata*. Fabric, Syst. Eleuth. II. n. 149.  
p. 213.

BUPRESTIS TARDA. Fn. Inf. germ. LXVIII. 21.

*Buprestis cyanea*. Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 168. p. 216.

BUPRESTIS GRAMINIS. Fn. Inf. germ. LXVI. 8.

*Buprestis Graminis*. Herbst. Nat. d. Käf. IX.  
n. 180. p. 262. tab. 155. fig. 5. a. b.

Herr

Herr Creützer sagt in seinen Versuchen p. 137. *Buprestem graminis* n. 8. (nehmlich Fn. Inf. germ. LXVI.) non Viennae, sed in vicinia maris Adriatici lect. esse, ex ore ipsius accepi collectoris — Megerlaci &c.

Man erlaube mir nun doch auch, als Gegenstück des voranstehenden anzuführen, was ich zwar nicht *ex ore*, des Herrn von Megerle in Wien, sondern aus dessen Schreiben an mich, vom 5ten Oktob. 1798, hierüber erhalten habe: n. 16. *Buprestis* — (und diese war *Bupr. graminis* Fn.) neu — auch hier um Wien auf hohem Grafs: ich bitte sie zu benennen.

*BUPRESTIS CANDENS.* Fn. Inf. germ. I. 9.

*Buprestis candens.* Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 171. p. 217.

Hieher gehört auch:

*Buprestis fulminans.* Schrank im Naturf. XXIV. n. 52. p. 84.

*Buprestis fulminans.* Hoppe elytr. erlang. p. 51.

*Buprestis fulminans.* Schrank Fn. boic. I. 2. n. 796. p. 604.

Um einigermaßen, auf die Hauptfarbe dieses Käfers hindeuten zu können, zumal andere sogenannte Trivialnamen, womit sich derselbe etwa eben so benennen liesse, *rutilans*, *ignita*, *fulminans*, *fulgida*, &c. schon eheöavor, vom Herrn Prof.

Prof. *Fabrizius*, andern Bupresten zugetheilt worden, wählte ich das Wort *candens*, keineswegs aber, um den Begriff, den Herr *Schrank* damit verbindet, ganz damit *erschöpfen* zu wollen; nach welchem *nur dann* ein schwarzer Körper glüht, wenn er *weiß* ist, weil *candere*, nichts *als weiß* bedeuten soll. Darum wäre *Buprestis fulminans* wohl ein weit *schicklicher Name*, wenn man sich nur darüber vereinigen könne, daß dasienige, was man insgemein unter *blitzen* versteht, auch die *Farbe* dieses Käfers seye. Ueberhaupt glaube ich, daß die Kritik nirgends unbequemer angebracht seyn würde, als wenn man sie um dergleichen Beynamen, oder Trivialnamen abzuwägen usurpirt. Wie würde *Linné*, *Fabrizius* und andere dagegen bestehen können? Wie *Fabrizius* mit seiner *Melolontha ridens* Ent. Syst. II. n. 104. p. 178?

ELATER RUFVS. Fn. Inf. germ. X. 11.

*Elater rufus*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 24.  
p. 225.

Bey *Fabrizius* sind die Citate meiner Faune irrig; man lese: *Elater rufus* X. 11. und *Elater ferrugineus* X. 10.

ELATER ATOMARIVS. Fn. Inf. germ. LXXVI. 1.

*Elater atomarius*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 42.  
p. 229.

Ich

Ich habe nirgends einen *Elater pulverulentus* bekannt gemacht: man streiche daher dieses Synonym in dem Syst. Eleuth. I. c. aus, und verwechsle es mit diesem.

ELATER CUPREUS. Fn. Inf. germ. LXVII. 2. 3.

*Elater cupreus*, Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 54.  
p. 231.

Schäff. Ic. Inf. ratisb. tab. 38. fig. 2. gehört nicht hieher, und bezeichnet meinen *Elater signatus*. Vergl. meine *Nomenclat. der Schäff. Inf.* n. 2. p. 54.

ELATER MELANCHOLICUS. Fn. Inf. germ. XCIII.  
11.

*Elater melancholicus*, Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 100. p. 241.

Durch einen seltsamen Mißgrif, kam dieser, bis izt noch undeutliche Käfer, in die Faun. Inf. Einen diesem sehr ähnlichen fieng ich zugleich, mit dem *Elat. aeneus* F. an einer meinem Wohnorte nahe gelegenen Hecke, und nur diesen wollte ich hier zeichnen lassen. Doch nachher, da es nicht mehr zu ändern war, entdeckte ich diesen Irrthum, den ich hier zur Steuer der Wahrheit anzeige.

ELATER CINCTUS. Fn. Inf. germ. XXXI. 21.

*Elater equestris*, Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 119.  
p. 244.

ELA-



ELATER SIGNATUS. Fn. Inf. germ. LXXVII. 5.

Schäffer Ic. Inf. ratisb. tab. 38. fig. 2.

Eine eigene sich sehr charakterisirende selbstständige Art. Sie varirt jedoch sehr.

$\alpha$  *Mas*: antennis pectinatis, cum maculis in apice elytrorum: *Elater signatus* Fn.

$\beta$  *Mas*: antennis pectinatis, absque maculis in apice elytrorum: *Elater aulicus* Fn.

$\gamma$  *Femina*: antennis simplicibus, cum maculis in apice elytrorum,

$\delta$  *Femina*: antennis simplicibus, absque maculis in apice elytrorum.

ELATER AULICUS. Fn. Inf. germ. LXXVII. 6.

Ist daher nur die obige var.  $\beta$ . Mit dem *Elater inaequalis* Fabric, glaube ich diesen Springkäfer nicht wohl vereinigen zu können: es müfste denn seyn, dafs *Fabrizius* ein Exemplar mit röthlichen Flügeldecken, und zwar obige var.  $\delta$  vor sich gehabt hätte, da er der *antennar. pectinatar.* nicht gedenkt.

Beide Abbildungen in der Faun. Inf. a. a. O. sind in Hinsicht der proportionirlichen Gröfse verfehlt: *Elater signatus* ist zu klein gerathen, und *Elat. aulicus* allzugrofs: denn beide sollen die natürliche Gröfse vorstellen.

ELA-

ELATER STICTICVS. Fn. Inf. germ. LXXVII. 9.

Gewiss dem *Elat. marginat. Fabric.* zumal nach der Abbildung zu sehliessen, sehr ähnlich, doch um vieles kleiner, auch sonst, durch die angegebenen Merkmale, und den übrigen Habitus verschieden, weswegen ich solchen gegenwärtig noch, von demselben entfernt zu halten, anrathen mögte.

ELATER LEPIDOPTERVVS. Faun. Inf. germ. LXXVIII. 4.

Sonst auch unter *Elater chrysoptastus*, wie mich Herr D. Illiger versicherte, bekannt, ausserdem eine distinkt verschiedene Art.

ELATER TAENIATVS. Fn. Inf. germ. LXXVI. 5.

*Elater fasciatus. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 43. p. 129.*

Herr D. Illiger hält dieses *taeniatus* nur für eine Abänderung des *E. fasciatus Fabric.* wiewohl nicht nur die Gröfse, sondern auch dessen übrige Eigenheiten, hiemit in Widerspruch zu stehen scheinen.

ELATER CRUCIFER. Fn. Inf. germ. LXXVI. 7.

Eine eigene Art: Hicher gehört: *Elater Rossi.* Oliv. Inf. 31. 52. 74. tab. 5. fig. 44, a. b.

ELATER TRIFASCIATVS. Fn. Inf. germ. III. 14.

*Elater undulatus, Payk. Fn. Suec. II. n. 10. p. 8.*

Degeer Inf. IV. n. 18. p. 155. tab. 5. fig. 23.  
bis 26.

*Fabrizius* hat jedoch schon einen *Elater undulatus*, weshalb, wie Herr D. *Illiger*, mit Recht erinnert, dieser ältere, vom Herrn Prof. *Hellwig* angegebene, den Vorzug verdient.

ELATER RUBENS. Fn. Inf. germ. VIII. 10.

*Elater denticollis*. Fabric. Syft. Eleuth. II.  
n. 61. p. 233.

Hieher gehört auch: *Elater pyrrhopterus* Fab.  
Syft. Eleuth. II. n. 82. p. 237.

ELATER BICOLOR. Fn. Inf. germ. VIII. 11.

*Elater linearis*. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 62.  
p. 233.

Ist das *Männchen*, wozu *Elater mesomel*. Fabr.  
als das *Weibchen* gehört.

ELATER NIGRICORNIS. Fn. Inf. germ. LXI. 5.

*Elater metallicus*. Payk. Fn. Suec. III. n. 22.  
p. 19.

ELATER FLAVICORNIS. Fn. Inf. germ. LXI. 6.

Befize ich nicht mehr, um über dessen Identität zu entscheiden.

ELATER PARVULVS. Fn. Inf. germ. LXI. 7.

In der differentia specifica, muß statt *elytris nigris* &c. *antennis nigris* gelesen werden. Auch diesen besize ich nicht mehr.

LYCA-

LUCANVS DORCAS. Fn. Inf. germ. LVIII. 11.

Doch alle diese mir charakteristisch gedünkten Auszeichnungen, scheinen nicht zu genügen. Er soll demohngeachtet nur *Spielart* des männlichen *Luc. Cervus F.* seyn.

LUCANVS CAPRA. Fn. Inf. germ. LVIII. 13.

Sey nur *Weibchen* des *Lucan. parallelipipedus F.* Aber auch Herr *Schrank* in seiner Fn. boic. I. 2. p. 376. bestimmt diesen Käfer, unter:

*Lucanus bipunctatus* nr. 323. als eigene Art, und scheint fast hievon überzeugt zu seyn: ich glaube, dafs es sehr gut wäre, wenn sich alle *Weibchen* so kenntlich auszeichneten.

LUCANVS RUFIPES. Fn. Inf. germ. LVIII. 14.

*Lucanus rufipes*, Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 14. p. 253.

Auch dieser sey nur *Spielart* des weiblichen *Luc. caraboides F.*, und dieß ist, nach den, von Herrn D. *Illiger*, in der Uebersetz. von *Olivier*, beygebrachten Gründen, sehr annehmbar.

LUCANVS SCARABAEOIDES. Fn. Inf. germ. XXVI. 15. 16.

*Aesalus scarabaeoides*, Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 1. p. 254.

PRIONVS SERRARIVS. Fn. Inf. germ. IX. 6.

Es wird zwar sehr oft behauptet, dafs dieser *Serrarius* nur Geschlechtsunterschied des *Prion. Faber Fabr.* seye. Ich kan jedoch diese Behauptung nicht durch eigene Erfahrung widerlegen, da dieser Käfer in meinen Gegenden, gar nicht, oder nur höchst selten vorkommen soll. Mich konnten nur, die von dem *Faber* sehr abweichenden Eigenheiten bestimmen, diesen *Serrarius* von demselben für verschieden zu glauben. Indessen halte ich solchen dennoch so lange für eine eigene Art, bis mehrere und bekanntere Erfahrungen, solchen zu seiner Stammart, wieder zurück weisen.

CERAMBYX CRINITVS. Fn. Inf. germ. XLVIII. 17.

*Cerambyx Quercus*, Roffi Fn. Etrusc. I. n. 362.  
p. 143.

LAMIA VITTIGERA. Fn. Inf. germ. XVIII. 24. ;

*Lamia vittigera*, Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 119.  
p. 303.

Hier ist das *Weibchen* abgebildet. Das *Männchen* ist beträchtlich kleiner, die Grundfarbe tief schwarz, und die weissen Streifen nehmen sich daher lebhafter aus.

STENOCORVS DISPAR. Fn. Inf. germ. XVII. 1. 2. ed. I.

*Rhagium dispar*, Fn. Inf. germ. XVII. 1. 2. ed. II.

Bestätigt sich jedoch als eigene Art.

RHA-

RHAGIVM MINVTVM. Faun. Inf. germ. VIII. 13.  
ed. I.

*Rhagium clathratum*. Fn. Inf. germ. VIII. 13.  
ed. II.

*Rhagium clathratum*, Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 9. p. 315.

SAPERDA ARGVS. Fn. Inf. germ. LXIX. 2.

*Saperda Argus*, Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 61.  
p. 329.

SAPERDA MICANS. Fn. Inf. germ. XXXV. 14.

*Saperda violacea*, Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 75.  
p. 331.

SAPERDA FLAVIMANA. Fn. Inf. germ. XXXV. 15.

*Saperda rufimana*, Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 85. p. 332.

SAPERDA BIPVNCTATA. Fn. Inf. germ. XXXV. 16.

Ich besitze diese - wahrscheinlich eigene Art  
nicht mehr, um hierüber zu bestimmen.

CALLIDIUM PVSILLVM. Fn. Inf. germ. LXXX. 6.

*Callidium pusillum*, Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 63. p. 344.

Bestätigt sich aufs neue, das diese meine Be-  
stimmung die richtigere seye. Vergl. *Creuzer*  
Verf. nr. II. p. 136. Hieher gehört auch, *Rossi*  
Fn. Etrusc. Mant. n. 132. p. 53.

CALLIDIUM VINI. Fn. Inf. germ. LXVI. 10.

*Callidium pygmaeum*. Fabric. Syft. Eleuth. II.  
n. 30. p. 339.

Herr von Megerle, dem ich diese Art verdanke, bemerkte bey der Einfendung derselben unterm 5ten Oktober 1793 aus Wien, folgendes an mich:

„8. *Callidium pusillum*. Halten Sie es auch dafür? Bilden Sie es auf alle Fälle ab: denn alle Jahre finden wir selbiges hier, und was das spassigste ist, in alten Fässern, die mit Birkenreifen beschlagen sind.“

Wohl verzeihlich wirds, wenn ich dann voranstehendes, in *habitat quotannis in doliis vetustis Viennae*, übersetzte.

CALLIDIUM FLORALE. Fn. Inf. germ. LXX. 16.

*Clytus floralis*. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 3.  
p. 346.

CALLIDIUM ARIETIS. Fn. Inf. germ. IV. 15.

*Clytus Gazella*. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 10.  
p. 348.

*Leptura arietis*. Linn. Syft. Nat. n. 23. p. 640.

LEPTURA SANGVINOLENTA. Mas. Fn. Inf. germ.  
LXIX. 9.

*Leptura cincta*. Mas. Fabric. Syft. Eleuth. II.  
n. 12. p. 356.

H

*Leptura*

*Leptura limbata*. Laichard. tyr. Inf. II. n. 16.  
p. 166. *exclus.* *Synonym.* Schöff.

Ist nach wiederholten Erfahrungen, *nicht*, was man anfangs, fast allgemein geglaubt hatte, das *Männchen* der *Lept. sanguinol. Fabr.* sondern *dieses*, der *L. cinctae Fabr.*

LEPTURA SANGVINOLENTA. *Maris Var.* Fn. Inf. germ. LXIX. 10.

Eben so nur eine Abänderung der *männlichen L. cinctae Fabr.*

LEPTURA VILLICA. Fn. Inf. germ. XXII. 13.

*Leptura villica*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 16.  
p. 357.

Das *Schäffer'sche Synonym*, inf. ratisb. tab. 69. fig. 1. gehört durchaus nicht hieher. Vergl. meine *System. Nomenclat. der Schöff. Inf.* n. 1. p. 86.

LEPTURA OBSCURA. Fn. Inf. germ. LXIX. 20.

*Leptura Chamomillae*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 30. p. 339.

Ich kenne die *Lept. pubescens Fabr.* nicht hinlänglich genug, um zu entscheiden, ob solche dieser Käfer ist, mit welchem die hier vorgestellte, von mehreren vereinigt wird: aber die bey uns häufige *Leptura holosericea F.* kenne ich zu gut, um gewis zu seyn, das gegenwärtige Figur, nach keinem Exemplar derselben verfertigt worden.



den. Hingegen ist meine ehemalige *L. obscura* genau diese *L. chamomillae*: denn nur auf diese trifft das *elytra apice in angulum excurrunt* genau zu, die übrigens sich von *L. holosericea*, so wohl durch ihre verschiedene Gröfse, als Umrifs des Körpers gut unterscheidet.

LEPTVRA SEXMACULATA. Fn. Inf. germ. LXIX. 21.

*Leptura octomaculata*. Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 44. p. 361.

Schäffer. Ic. Inf. ratib. tab. 6. fig. 9.

Demnach fällt die ganze Synonymie in der Fn. Inf. bey diesem Käfer hinweg: ingleichen ist in meiner *system. Nomenclat. der Schöff. Inf.* n. 9. p. 9. die daselbst befindliche Bestimmung, als irrig, nach dieser zu emendiren.

LEPTVRA ARCVATA. Fn. Inf. germ. VIII. 12.

Ich besitze diesen Käfer nicht mehr. Mit *Leptura annularis Fabric.*, die ich jedoch nicht genau genug kenne, um mit Gewifsheit hierüber zu entscheiden, hat, der Beschreibung nach, diese *Lept. arcuata*, sehr viel übereinstimmendes.

NECYDALIS MELANOCEPHALA. Faun. Inf. germ.  
XXXVI. 9.

Man behauptet, *Necydal. melanocephala Fabric.* sey nichts anders, als nur Abart seiner *ustulata*, oder — welches jedoch Unterschiedes genug ist —

ihr nahe verwandt. Hierüber, da ich den Fabrizioſchen Käfer nur aus feiner Befchreibung kenne — kan wenigſtens ich, nichts erhebliches aufbringen. Es ſey nur von meiner *N. melanocephala* die Rede, die, wenn ſie gleich doch *Fabrizius*, nun auch mit feiner *melanocephala* verbindet, dennoch den Beweis für mich nicht verſtärken ſoll. Nur mein Käfer ſey *Necydalis flavescens Roſſi* Mant. Inf. n. 139. p. 56. oder vielmehr nur Abänderung derſelben, wohin auch *Geoffr. I. n. 5. var. p. 313.* gehöre: das glaube ich auch, nur daſs ſolche das *andere Geſchlecht* von *Necyd. Podagrariae F.* zugleich auch ſeyn könne, das muſs ich mit *Villers Ent. I. p. 281.* verneinen.

NECYDALIS FEMORATA. Fn. Inf. germ. XXXVI.

12.

*Fabrizius* führt in dem Syſt. Eleuth. II. n. 30. p. 373. dieſe meine *femorata* nur zweifelhaft bey feiner *Necydal. marginata* an, und fragt ob ſolche etwa, wegen der femor. clav. nur das andere Geſchlecht von der ſeinigen ſeye? Ich glaube, die *Cantharis phthiſica Scop. caru. n. 144. ic. 144.* gehöre, nach der Abbildung zu ſchließen, welche femora ſimplicia anzeigt, gleichwohl auch hier, und dieſe *femorata*, könne füglich als das *andere Geſchlecht*, analogice hiezu genommen werden.

NECY.

NECYDALIS COLLARIS. Fn. Inf. germ. XXXVI.

10.

*Necydalis melanura*. Fabric. Syst. Eleuth. II:

n. 17. p. 371.

Nur als Abänderung gehört *collaris* unter *melanura*, denn diese *melanura* sey selbst nur Spielart der *Necyd. ustulata*. Fabr.

NECYDALIS ADVSTA. Fn. Inf. germ. [XXXVI. 11:

Diese *adusta* hält man für das Weibchen von *simplex*. Fab. Dies widerspricht aber schon der um vieles und ganz anders ausgezeichnete Körper. Meine *Necyd. adusta* ist so groß wie *Necyd. melanura* Fabr.; aber nie sahe ich die bey uns häufige *N. simplex* F. von dieser Größe.

NECYDALIS FLAVICOLLIS. Fn. Inf. germ. XXIV.

18.

*Necydalis sanguinicollis*. Fabric. Syst. Eleuth. II:

n. 7. p. 370.

Ueber diese richtige Bestimmung, leistet dasselbe Exemplar Gewähr, welches Herr *Hübner* in Halle, Herrn D. *Illiger* mitgetheilt hat, dem ich solche verdanke.

SINODENDRON MURICATUM. Fn. Inf. germ. XXXV.

15.

*Sinodendron muricatum*. Fabric. Syst. Eleuth.:

II. n. 6. p. 377.

Mau

Man glaubt, dieses Sinodendron flünde besser unter *Apate*.

*BOSTRICHUS CHALCOGRAPHUS*. Faun. Inf. germ. XV. 4.

*Bostrichus sexdentatus*. Oliv. V. 111. 13. ic. 77. tab. I. fig. 3. a. b.

*Apate sexdentata*. Illiger.

Der wahre *Bostrich. chalcographus* Fab. ist Fn. XXXIX. 20. abgebildet worden: dieser gehört unter *Apate*.

*BOSTRICHUS THORACICUS*. Fn. Inf. germ. XXXIV. 18. *Femina*.

*Apate dispar*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 21. p. 382.

*Bostrichus dispar*. Herbst. Nat. d. Käf.

Nach Herrn D. *Illigers* eigener Bestimmung, und angefügter Bemerkung, gehört dieser kleine Borkenkäfer vielmehr unter *Bostrichus* als unter *Apate*. Mir wurde ehedem dieses Exemplar, nach welchem diese Zeichnung verfertigt worden, vom Herrn Prof. *Hellwig* in Braunschweig, unter obigen Namen gefälligst mitgetheilt.

*BOSTRICHUS BREVIS*. Fn. Inf. germ. XXXIV. 20.

*Hyletinus abietinus*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 6. p. 391.

Nach

Nach Herrn D. Illigers *Bestimmung*, sey dieser *Bostr. brevis* Fn. nur das *Männchen* des obigen *Bostrich. thoracicus* Fn., mit dem es nicht selten in Braunschweig in der Begattung gefangen worden. Das ist wohl glaublich, und die Sexualaffinität beyder läßt schwerlich Zweifel übrig, nur gehört auch der *Hylesinus abietinus* Fabric. l. c. hieher.

BOSTRICHUS SERRATUS. Fn. Inf. germ. XXXIV.

19.

*Ein kleines eben der Puppenhülfe entschlüpftes Stück von Bostr. dispar* Herbst. *Wir besitzen ein solches von diesem. Illiger.*

Dies ist nicht wohl anzunehmen. Mag es seyn, daß der bleichen Farbe nach zu urtheilen, dieser *B. ferratus*, ein eben der Puppenhülfe entschlüpftes Stück sey, so kan er doch durchaus nicht mit *Apate dispar* vereinigt werden. Diesem widerspricht nicht nur die *allzusehr abweichende Größe*, die Villofität der Flügeldecken, sondern auch die bey weitem zärteren, und kaum unter einem sehr guten Suchglase bemerkbaren Punktstreifen der Flügeldecken, der ganz gelbe Unterleib, und der völlig unter das Bruststück zurückgezogene kleine Kopf. Die Abbildung stellt dies alles nicht deutlich genug vor: die Punktstreifen sind viel zu stark angegeben.

Bo-

**BOSTRICHVS FLAVIPES.** Fn. Inf. germ. LXI. 9.

Ich besitze diesen Käfer nicht mehr, um über solchen mit Gewisheit zu sprechen. Vielleicht ein *Hylesinus*?

**BOSTRICHVS DACTYLIPERDA.** Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 14. p. 387.

Diese genannte Art, bey welcher Herr *Fabrizius* meine Fn. Inf. citirt hat, kommt gar nicht hier vor; ein sehr wahrscheinliches Mißverständniß hat dieses Citat veranlaßt.

**BOSTRICHVS FRAXINI.** Fn. Inf. germ. LXVI. 15.

*Hylesinus Fraxini.* Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 3. p. 390.

Vergl. *Creutzer* Versuche p. 136. wofelbst dieser *Bostriehus Fraxini* Fn. l. c. für eine Spielart des *Bostrieh. varius Fabr.* ausgegeben wird. Herr *Creutzer* irrt sich aber sehr, wenn er dies noch glauben dürfte. Ich kan nicht wissen, was für einen *Hylesinus* Herr Prof. *Fabrizius* vom Herrn Apotheker *Scheiäler* erhalten hat, nur das weiß ich, daß ich mehrere Exemplare meines *Bostrieh. Fraxini* Fn. an Herrn Prof. *Fabrizius* geschickt habe, der auch damals schon eben diesen *Bostr. Fraxini* Fn. für eine *neue*, und von dem *B. varius* ganz verschiedene *Art*, erkannt hat. Es wäre auch gut gewesen, wenn Herr Prof. *Fabrizius* angezeigt hätte, *wem* man die Beobachtung verdankt,

dankt, dafs dieser *Bostrichus Fraxini* Fn. an der Rinde der Efche folche tophusartige Auswüchse bearbeitet, denn ich habe doch zuerft folche bekannt gemacht. An den, in der Hopfau bey Herfpruck ftehenden Efchen kan man jährlich im Auguft und September folche in grofser Menge antreffen, und aus folchen von der Rinde glatt hinweg gefchnittenen Tophis, habe ich mehrere hunderte Exemplare vor mir gehabt, die fich sämtlich, etwa mehrere oder mindere Gröfse abgerechnet, ganz gleich waren.

*BOSTRICHVS TESTACEVS.* Fn. Inf. germ. LXVI. 14.

Vergl. *Creutz.* Verf. p. 136. wofelbst dieser *B. testac.* Fn. nur für eine Spielart des *Bostrich.* nun *Hylefin.* piniperd. Fab. — und wie auch ich glaube, mit Recht anerkannt wird. Es ift hier nur ein noch frifches ohnlängft der Puppenhülle entfchlüpftes Exempl. dieses *Hylefin.* piniperd. F., vorftellig gemacht worden. Folglich fällt das Citat der Fn. in der Syft. Eleuth. II. n. 14. p. 393. bey *Hylefin. testaceus* von felbst hinweg.

*BOSTRICHVS POLIGRAPHVS.* Fn. Inf. germ. XV. 5.

*Bostrichus polygraphus.* Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 12. p. 387.

*Linné* fchrieb ftets *polygraphus*, nicht *polygraphus*, fo wie *Polianthes* nicht *Polyanthes*, darum fchrieb auch ich fo, weil ich glaubte, es zieme  
jedem

iedem, der *Linnées* Nomenclatur, oder auch die — irgend eines andern Naturforschers wiederholen muß, solche, wenn sie nicht offenbar irrig ist, auch *correct* wieder zu geben, wäre es auch nur aus Achtung, für den, der solche zum erstenmal gebraucht hat. Auch lasse es sich, meiner Meinung nach, gar wohl denken, daß ein so correcter Mann, wie *Linné* war, wohl *polygraphus* und *Polyanthes* geschrieben haben würde, wenn er hiebey die Begriffe hätte verbinden wollen, die man gewöhnlich mit *πολυγραφος* und *πολυανθη* zu verbinden pflegt: um so mehr wollte wenigstens ich nicht, *Linné* einen Begriff zuschieben, den er im Leben wahrscheinlich als nicht *sein eigen* anerkannt haben würde.

BRUCHUS LUTEICORNIS. Fn. Inf. germ. XXV. 23.

Ist eine eigene Art.

BRUCHUS IMERICORNIS. Fn. Inf. germ. XXV. 24.

*Bruchus Galegae*. Roffi Fn. Etrusc. Append.

82. 10.

Diese Bestimmung wurde mir vom Herrn D. Illiger gefälligst mitgetheilt. Ich besitze den Append. Fn. etrusc. nicht.

ANTHRIBUS BREVIROSTRIS. Fn. Inf. germ. LVII. 9.

*Anthribus niveirostris*. Fabric. Syst. Eleuth. II.

n. 18. p. 409.



ANTHRIBVS RUFICOLLIS. Fn. Inf. germ. XXIV. 19.

*Salpingus ruficollis*. Illig.

Kein *Anthribus*! Vom *Anthribus Roboris* Fab. ist dieser Käfer standhaft verschieden.

ATTELABVS BACCHVS. Fn. Inf. germ. XX. 5.

*Attelabus Bacchus*. Fabric. Syst. Eleuth. II.

n. 27. p. 421.

In dem Syst. Eleuth. a. a. O. kommt nun zum *erstenmal* die richtige Bemerkung vor: *Variat sexu; thorace antrorsum spinoso*. Diese Abbildung, so wie *Voet*. II. tab. 34. fig. 6. haben schon lange zuvor diese Bemerkung erwiesen. Doch hat man in der A. L. Z. 1797. Nr. 39. p. 306. das Gegentheil behauptet: *Das mit zwey Dornen bewaffnete Brustschild* (nehmlich an dieser meiner Figur in der Fn. Inf. a. a. O.) *ist eine auffallende Erscheinung. Wir finden dazu weder unter unserem Vorrathe, noch bey andern Schriftstellern das Beyspiel. Die Vermuthung, daß daher dieser Käfer nicht der Bacchus sey, gewinnt durch &c.* (nun folgen die unnöthig hieher zusehenden Gründe) *den größten Schein der Gewisheit.* —

Ich hätte demnach, nach *Voet* a. a. O. das größte Recht an der Entdeckung, *daß es einen Attelab. Bacchus Fabr. et Linn. mit einem stachlichten Bruststück gebe.* Vergleiche meinen Commentar zur angeführten *Voetschen* Figur, IV. Th. meiner Ausgabe p. 47.

ATTE-

ATTELABVS CRACCAE. Fn. Inf. germ. XX. 10.

*Attelabus aeneus*. Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 37. p. 423.

ATTELABVS FRUMENTARIIVS. Fn. Inf. germ. XX.  
14.

*Attelabus frumentarius*. Fabric. Syst. Eleuth.  
II. n. 59. p. 427.

*Attelabus purpureus*. Fabric. Ent. Syst. II.  
n. 34. p. 391.

Herr Prof. *Fabrizius* zieht nun auch den *Attelabus purpureus* Ent. Syst. und wie auch ich glaube, mit Recht hieher. Ueber den Aufenthaltsort dieses Käfers sind die Meinungen verschieden. Einige haben ihn *immer nur* auf grünen Gewächsen, (auf Aegopod. Podagrar. L. *Payk.* Fn. Succ. III. p. 177.) vorzüglich in nassen Gräben auf dem Ampfer angetroffen (f. *A. L. Z.* 1797. Nr. 39. p. 306.) Herr Prof. *Fabrizius* wiederholt, das schon von *Linné*, *habitat in frumento diutius asservato* gefagte, hier abermals, und da *Linné* noch hinzusetzt, *peffimus*, so muß er doch als ein dem Getreyde schädliches Insekt anerkannt werden. Möglich, das man ihn auch anderswo als nur auf Kornspeichern findet, so wie ich mehrmals *Calandra granaria F.* auch an Orten antraf, wo gewis nie Kornspeicher waren, welche beyde Fälle vielleicht nur durch Zufall veranlaßt worden sind.

ATTE-

ATTELAEVS INTERMEDIVS. Fn. Inf. germ. XXI. 22.

Ist eine eigene deutlich verschiedene Art.

CYRCVLIO PINI. Fn. Inf. germ. XLII. 1.

*Rynchaenus Pini*. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 7.  
p. 440.

Vergl. *Herbst*. Naturg. d. Käf. VI. p. 147.

CYRCVLIO LINARIAE. Fn. Inf. germ. XXVI. 18.  
ed. I.

*Rhynchaenus teter*. Fn. Inf. germ. XXVI. 18.  
ed. II.

*Rhynchaenus teter*. Fabric. Syft. Eleuth. II.  
n. 5c. p. 448.

Ich zweifle indess sehr an dieser Bestimmung, und es ist möglich, dafs *Fabrizius* sich durch diese unnatürlich schwarze Illumination, dieser Figur getäuscht habe. Außerdem wird wohl schwerlich der *R. teter* F., schon wegen der sehr abweichenden Gröfse (Statura et magnitudo C. Campanulae) hier in Vergleich kommen können. Der *Rhynch. Campanulae* F., den einige irrig mit dem *C. linariae* Fn. vereinigen, ist ein viel kleinerer Käfer, (Linné sagt *magnitud. pediculi*, aber das ist gar zu arg, er ist doch gröfser) der ganz von dem unferigen abweicht: richtiger ist folgende Bestimmung:

CYRC-

CYRCYLIO LINAR. Fn. I. c.

*Rhynchaenus Aiugae*. Illiger.

*Rhynchaenus Aiugae*. Herbst. Nat. d. Käf. VI.  
172. 132.

Von seinem wahrscheinlich gewöhnlichen Aufenthaltsorte, in den gallenförmigen Auswüchsen der Wurzeln, des *Antirrhin. Linaria Linn.*, ob man gleich nicht alle Jahre, und nicht an jedem Antirrh. Linar. L. diesen Käfer findet, entlehnte ich, nach der Beobachtung des Herrn *Schnitzlein*, den Beynahmen für denselben. Dafs er auch auf einer *Aiuga* angetroffen werden könne, ist möglich, und eben darum finde ich diesen neuen Beynamen nicht unpaffend. Aber weder die *Linaria* noch eine von den *Aiugis* sind die ausschliesslichen Aufenthaltsorte dieses Käfers. Eben dieser *Curcul. linariae* Fn. zerstörte mir heuer das *Verbascum Boerhaavi L.* im Garten zugleich mit *Rhynch. Scrophul.* und *Thapsus* so sehr, dafs, wenn ich nicht täglich solche in groszer Anzahl abgefangen hätte, die ganze schöne vier Schuh hohe Pflanze, gewis von demselben, völlig zu Grunde gerichtet worden wäre.

CYRCYLIO AFFINIS. Fn. Inf. germ. LVII. 15.

*Rhynchaenus Alauda*, Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 82. p. 454.

CURCULIO DORSALIS. Fann. Inf. germ. XVII. 9.

*Rhynchaenus dorsalis*. Fabric. Syft. Eleuth. II.  
n. 83. p. 454.

Hierher gehört auch *Curculio dorsalis* Paykull  
Fn. Suec. III. n. 17. p. 200. nicht aber *Curculio*  
*dorsalis* Linn. der nach der Fn. Suec. eine ganz  
andere Art feyn muß.

CURCULIO ARTEMISIAE. Fn. Inf. germ. XVIII.  
10.

*Rhynchaenus Artemisiae*. Fabric. Syft. Eleuth.  
II. n. 92. p. 456.

*Curculio Artemisiae*. Herbst. Nat. d. Käf. VI.  
tab. 66. fig. 5.

CURCULIO LAPATHI. Fn. Inf. germ. XLII. 15.

*Rhynchaenus Lappathi*. Fabric. Syft. Eleuth. II.  
n. 140. p. 466.

Nicht nur auf den Ampfer- und Weidenarten  
hält sich dieser Käfer auf, er ist auch in manchen  
Jahrgängen für die Erlen (*Betula Alnus* Linn.)  
ein sehr schädliches Insekt.

CURCULIO ACETOSAE. Fn. Inf. germ. XLII. 9.

*Rhynchaenus Rumicis*. Fabric. Syft. Eleuth. II.  
n. 93. p. 436.

CURCULIO PORCATVS. Fn. Inf. germ. LVII. 16.

*Rhynchaenus porculus*. Fabric. Syft. Eleuth. II.  
n. 144. p. 467.

CUR-

- CYRCVLIO SALICIS. Faun. Inf. germ. XVIII. 15.  
*Rhynchaenus Crux*. Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 87. p. 455.
- CYRCVLIO JOTA. Fn. Inf. germ. XVIII. 16.  
Ist nichts anders als ein verwischtes Exemplar  
des vorhergehenden.
- CYRCVLIO PARALLELVS. Fn. Inf. germ. XVIII. 5.  
*Rhynchaenus venustus*. Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 90. p. 456.
- CYRCVLIO QVADRIDENS. Fn. Inf. germ. XXXVI.  
13.  
*Rhynchaenus Calcar*. Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 261. p. 493.
- CYRCVLIO VIDVVS. Fn. Inf. germ. XLII. 17.  
*Rhynchaenus didymus*. Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 209. p. 482.
- CYRCVLIO PECTORALIS. Fn. Inf. germ. XXXVI.  
16.  
*Rhynchaenus pectoralis*. Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 246. p. 490.
- CYRCVLIO FLAVIPES. Fn. Inf. germ. LXII. 11.  
*Rhynchaenus flavipes*. Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 247. p. 490.

CYRCYLIO PVSIO. Fn. Inf. germ. XXXVI. 15.

Die Flügeldeckennaht ist *schwarz*, wie ich es auch in meiner Beschreibung anzeigte. Eine neue sehr distinkte Art.

CYRCYLIO ARCVATVS. Fn. Inf. germ. XVIII. 6.

*Rhynchaenus arcuatus*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 248. p. 490?

Ob gleich Herr Prof. *Fabrizius* a. a. O. die Fn. Inf. wenn gleich, *wie es scheint*, mit nicht vergleichener Abbildung daselbst, anführt, so scheint der Beschreibung nach doch der *Fabrizische arcuatus* ein, von dem meinigen sehr verschiedener Käfer zu seyn. *Fabrizius* sagt, *pallidus*, und spricht von *elytris cinerascensibus*. Das trifft auf den meinigen nicht zu. Eben wegen seiner *gelbfüchtigen* Farbe, nannte ich den meinigen *arcuatus*, weil auch *morbus arcuatus*, als Synonym von *Icterus* vorkommt. Das übrige sagt meine Beschreibung.

CYRCYLIO INCURVVS. Fn. Inf. germ. XXXVI. 17.

*Rhynchaenus Pomorum*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 250. p. 491.

CYRCYLIO BICOLOR. Fn. Inf. germ. XVIII. 4.

*Lixus bicolor*.

Ist eine eigene nun unter *Lixus* bestimmt gehörige Art.

CURCULIO APSINTHII. Fn. Inf. germ. XVIII, 9.

*Rhynchaenus nigrinus*. Illig.

*Curculio nigrinus*. Herbst. Nat. d. Käf. VI.  
n. 20. p. 60. tab. 62. fig. 16.

*Vielleicht*, schrieb mir Herr D. Illiger hierüber,  
*Lixus Atriplicis Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 31.*  
*p. 504. wo die Citate aus Linné und Paykull weg-*  
*zustreichen sind.* —

Dieser Curcul. Apfenth. Fn. ist dem Curc. Ar-  
temis. Fn. 18. 10. überaus ähnlich, und ein Rhyn-  
chaenus wie dieser, und gewis kein Lixus.

CURCULIO CHLORIS. Fn. Inf. germ. XVIII.

*Rhynchaenus Chloris*. Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 39. p. 446.

Hierher gehört auch: *Curculio caerulefcens*  
*Schrank*. inf. austr. n. 202. folglich auch *Fn. boic. I.*  
*n. 525.* und *Scop. carn. n. 87.* und zwar nach A.  
L. Z. 1796. n. 97. Doch kan ich das von meinem  
Käfer nicht sagen, was *Schrank* u. *Scopoli*: auch  
trifft das angegebene Größenmaafs beider nicht zu.

CURCULIO QUADRINOTATUS. Fn. Inf. germ. LVII.  
12.

*Rhynchaenus Hercyniae*. Illig.

*Curculio Hercyniae* Herbst. Nat. d. Käf. VI.  
n. 265. p. 294. tab. 82. fig. 11.

aber



aber auf keine Weise *Curcul. T album* Linn. Payk.,  
der mit *Curcul. funereus* Herbst. l. c. nr. 122. ei-  
nerley ist. Illiger.

CVRCVLIO BRVNNVS. Fn. Inf. germ. XXVI. 17.

Eine sehr deutlich sich kennbar machende Art.

CVRCVLIO HORRIDVS. Fn. Inf. germ. LXXXIV. 9.

Eine wohl unterschiedene Art, auch am Rhein  
und bey Göttingen gefunden. *Rhynchaenus hispi-*  
*cus nobis, olim Illiger.* Herr Apotheker Funk  
in Gfrees bey Bayreuth hat auch diesen Käfer auf  
dem Fichtelberg entdeckt.

CVRCVLIO DESERTVS. Fn. Inf. germ. XLII. 8.

Hat große Aehnlichkeit mit *Rhynchaenus tri-*  
*guttatus Fabric.* ich kan jedoch, weil ich ihn  
nicht mehr besitze, nicht hierüber entscheiden.

CVRCVLIO OPHTHALMICVS. Fn. Inf. germ. LVII.  
15.

*Curculio distinctus.* Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 56. p. 516.

CVRCVLIO GLAVCVS. Fn. Inf. germ. XIX. 6.

*Curculio obliquus.* Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 58. p. 516.

Der hier vorgestellte *C. glaucus*, ist weder der  
gleichnamige des *Fabricius*, noch der *Curculio*  
*nebulosus* desselben, noch weniger dessen Abän-  
derung.

**CYRCVLIS DERASVS.** Fn. Inf. germ. LVII. 11.

*Hat große Aehnlichkeit mit Curcul. binotat. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 190. der mancherley Spielarten hat, aber stets mit stumpfen Schenkelzähnen vorkommt. Illiger.*

Indessen weicht die Beschreibung doch sehr ab, der zu Folge ein punctum parvum distinctum versus apicem elytrorum präsendirt wird, das nicht zugegen ist, vielmehr andere charakteristische Eigenheiten zugegen sind, deren nicht gedacht worden. Ich besitze diesen Käfer nicht.

**CYRCVLIO FRITILLVM.** Fn. Inf. germ. XVIII. 19.

*Curculio Fritillum.* Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 81. p. 521.

**CYRCVLIO MEGERLEI.** Fn. Inf. germ. LXXXVII. 7.

*Curculio Megerlei.* Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 84. p. 521.

Die Abbildung in der Fn. Inf. wurde nach dem nehmlichen Exemplar gefertigt, welches Herr von *Megerle* mir gefälligst abgetreten hatte. Würde es sich bestättigen, daß wenigstens die meisten Exemplare *femora dentata* hätten, so würde dieser *Curculio* nicht mehr unter dieser Abtheilung der wahren *Fabrizischen Curculion.* stehen bleiben dürfen,

CVRCVLIO ENVCLEATOR. Faun. Inf. germ. LVII. 14.

Ich besitze diese Art nicht mehr, um hierüber sicher zu bestimmen.

CVRCVLIO PABVLINVS. Fn. Inf. germ. LVII. 19.

*Einem eben entwickelten Curcul. ovatus Fabr. und Linn. sehr ähnlich. Illiger.*

Ueberaus viel wahrscheinliches hat diese scharfsinnige Coniektur: ich besitze diesen Käfer nicht mehr, um hierüber zu entscheiden.

CVRCVLIO CVPRIFER. Fn. Inf. germ. LXI. 10.

Auch diesen habe ich an Herrn von Megerle wieder zurückgegeben; ich kenne ihn also nicht mehr.

CVRCVLIO GRACILIPES. Fn. Inf. germ. LVII. 18.

*Dem Curc. ruficollis Fabr. ähnlich. Doch scheint die Gestalt des Halschildes, und die Färbung der Flügeldecken verschieden. Illiger.*

Auch diesen Käfer besitze ich nicht mehr.

CVRCVLIO DENTATVS. Fn. Inf. germ. LVII. 13.

Eine eigene Art.

CVRCVLIO CLOROPVS. Fn. Inf. germ. XIX. 14.

*Hylesinus cloropus, Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 17. p. 393.*

Hierher gehört unstreitig:

CVR-

CYRCVLIQ PLANIROSTRIS. Fn. Inf. germ. XVIII.  
18.

und wie es scheint, nur als *Abänderung*.

COLYDIVM FASCIATVM. Fn. Inf. germ. XXXI. 22.  
*Dermestes elongatus*. Linn. Syst. Nat. n. 2.  
p. 561. Fn. Succ. n. 409.

HYPOPHLOEVS PINI. Fn. Inf. germ. LXVII. 19.  
Hieher gehört als Synonym:

*Hypophloeus ferrugineus*. Creutz. Verf. p. 126.  
Tab. III. fig. 30. a.

LYCTVS CYLINDRICVS. Fn. Inf. germ. XXXV. 18.  
Ist nicht *Lyctus terebrans Fabric.* sondern eine  
eigene verschiedene Art.

LYCTVS PUBESCENS. Fn. Inf. germ. VI. 17.  
Auch eine eigene für sich bestehende Art.

LYCTVS DERMESTOIDES. Fn. Inf. germ. VIII. 15.  
ed. I.  
*Ips ferruginea*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 17.  
p. 580.

LYCTVS ABBREVIATVS. Fn. Inf. germ. XXIV. 21.  
*Nitidula sexpustulata*. Fabric. Syst. Eleuth.  
I. n.

Nicht als die wahre *N. sexpustul. F.* sondern  
nur als *Abänderung* derselben, gehört dieser *Ly-*  
*ctus abbrev.* Fn. hieher.

MYCETOPHAGVS PUNCTATVS. Fn. Inf. germ. XII.  
12.

*Ips punctata*. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 13.  
p. 579.

MYCETOPHAGVS BIFASCIATVS. Fn. Inf. germ. II.  
24.

*Ips bifasciata*. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 14.  
p. 579.

MYCETOPHAGVS FVLVICOLLIS. Faun. Inf. germ.  
LXII. 4.

*Mycetophagus fulvicollis*. Fabric. Syft. Eleuth.  
II. n. 21. p. 569.

Die maculae elytrorum find nicht rufae, fon-  
dern *flavae*, fo wie folche auch *Payk.* Fn. Suec. III.  
n. 6. p. 325. anzeigte.

MYCETOPHAGVS SPINIPES. Fn. Inf. germ. XXIV.  
20.

*Mycetophagus castaneus*. Fabric. Syft. Eleuth.  
II. n. 25. p. 569.

MYCETOPHAGVS SIGNATVS. Fn. Inf. germ. LVII.  
20.

*Ips bifasciata*. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 14.  
p. 579.

Sey nur eine Abänderung der *Ips bifasciat.* F.  
nach der Bemerkung des Herrn D. *Illigers*.

MYCE-

MYCETOPHAGVS BRUNNEVS. Fn. Inf. germ. LVII.  
21.

Vielleicht eine eigene Art. Ich besitze diesen Käfer nicht mehr.

TRITOMA DUBIA. Fn. Inf. germ. XXXIX. 22.

*Anisotoma dubium*. Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 8,  
p. 78.

Ist nicht Trit. dub. Fabric. Diese gehört bekanntlich unter *Catops agilis*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 6. p. 565. wofelbst jedoch der *Ptomoph. agilis* Illig. auszustreichen.

TRITOMA PILOSA. Fn. Inf. germ. VII. 8.

*Coccinella flavipes*. Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 3.  
p. 413.

Gehört jedoch mit mehr Recht unter Tritoma, selbst mit Herrn D. Illigers Beystimmung.

TETRATOMA CINNAMOMEA. Fn. Inf. germ. XII. 15.

*Anisotoma cinnamomeum*. Illiger.

Ist den Fühlhörnern nach wohl unter Anisotoma zu rechnen, doch kaum der übrigen, für ein *Anisotoma*, unerwarteten Struktur nach, wie denn auch die gewis sehr auffallende Gröfse hier mit in Betracht kommt. Ob das *Sphaerid. ferrug.* Payk. Fn. Succ. I. n. 24. p. 72. hierher gehören könne, ist vielleicht kaum zu bezweifeln; es kommt zwar in dessen Beschreib. verschiedenes

vor, das auf gegenwärtigen Käfer nicht zutrifft; auch gedenkt solcher der sonderbar gestalteten Füße gar nicht, wiewohl es fast für gewis anzunehmen ist, dafs sich dieser Umstand nur also an dem andern Geschlecht bewähre.

TRITOMA CONNATA. Fn. Inf. germ. XXXVI. 18.

*Tritoma connatum*. Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 9. p. 572.

Vergl. *Allgem. Lit. Zeit.* 1797. n. 143. p. 327.

SCAPHIDIVM SCUTELLATVM. Fn. Inf. germ. IV.

11.

*Dermestes Urticae*. Fabric. Syst. Eleuth. I.  
n. 44. p. 320.

SCAPHIDIVM AGARICINVM. Fn. Inf. germ. IV. 2.

*Scaphidium agaricinum*. Fabric. Syst. Eleuth.  
II. n. 4. p. 576.

Dies in der Fn. Inf. a. a. O. abgebildete *Scaph. agaric.* ist ganz das nehmliche mit.

SCAPHIDIVM BOLETI. Fn. Inf. germ. XII. 16.

Denn dieses ist nur, ein nicht lange seinen Nymphenstand verlassen habendes Exemplar. Die Fühlhörner am *bolet.* sind ganz die nehmlichen wie am *agaricin.*, wenn sie gleich in der Abbildung verschieden sind.

Bey

Bey *Scaph. agric. Fabr.* mußs in der Ent. Syst. I. der *Derm. hemipt. Panz. Naturforsch. &c.* wegfallen, der zum *Dermestes Urticæ F.* gehört.

IPS NIGRIPENNIS. Fn. Inf. germ. L. 7.

*Triplax nigripennis.* Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 1. p. 581.

IPS RUFIPES. Fn. Inf. germ. XIII. 17.

*Triplax rufipes.* Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 2. p. 581.

IPS RUFIFRONS. Fn. Inf. germ. XXXVI. 19.

*Engis rufifrons.* Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 4. p. 583.

DIAPERIS VIOLACEA. Fn. Inf. germ. III. 18.

*Diaperis violacea.* Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 3. p. 586.

*Chrysomela dytiscoides.* Roffi Fn. Etruf. I. n. 208. p. 83.

DIAPERIS BICOLOR. Fn. Inf. germ. XCIV. 9.

*Diaperis bicolor.* Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 6. p. 586.

Schäffer Ic. Inf. ratisb. tab. 257. fig. 5. a. b.

Panzer system. Nomenclat. d. Schäf. Inf. n. 5. p. 207.

Ich lasse hier Herrn D. Illiger selbst sprechen:

*Ihr Scolytus aeneus Fn. Inf. germ. VIII. 2. ist wohl unstreitig Diaperis aenea Fabric. aber auch dessen Mycetophagus metallicus, und vielleicht auch seine*



seine *Galleruca Lactucae*. Eben so sicher ist ihre *Diaperis bicolor*. Fn. 94. 4. eine Spielart von ihr, und wenn sie überzeugt seyn können, daß ihr Käfer der *Fabrizische* ist, so muß auch dessen *Diaperis bicolor* hieher gezogen werden. So hellfarbig wie die Fn. im 94sten Hefte den Käfer vorstellt, habe ich ihn zwar noch nie gesehen; allein das Braunrothe schimmert auf dem Halschilde allemal durch.—

Mein *Scolytus aeneus* Fn. l. c. zeigt sehr deutlich ein dunkelbraunrothes Bruststück an, und dieses ist in der Abbildung übersehen worden. Die *Diaperis bicolor* Fn. l. c. ist durchaus ganz gewiß der nehmliche Käfer, nur mit ungleich hellerem braunrothen Bruststück. Demnach gehören beide Abbildungen nur unter eine Art. Ob ich aber die wahre *Diaperis bicolor Fabric.* hier vorstellig gemacht habe, das mögte diesernach wohl noch nicht entschieden seyn. *Fabrizius* Käfer scheint gar nichts metallartiges an sich zu haben. er sagt bloß sie sey, *atra*, und im Suppl. Ent. Syst. p. 179. zeigt er *elytra laevia* (also nicht einmal *substriata*) an, und spricht von *pedibus anticis rufis*: wenn nun dies, die *Diaperis bicolor Fabr.* ganz ausschließend auszeichnende Charaktere sind, welche die standhafte Identität dieser Art bestimmen, so muß ich gestehen, daß solche meiner *Diap. bicolor.* keineswegs zukommen. Es mögte

mögte daher wohl gethan seyn, so lange, bis dieser Umstand näher in das Reine gebracht wird, beyde, meine *Diaperis bicolor* und *Scolytus aeneus* Fr. unter einer Art aufzuführen, die Paykull (Fn. Suec. n. 3. p. 359.) sehr gut unter *Diaperis aenea* charakterisirt hat. Dafs der *Mycetophagus metallicus* hierher gehöre, habe ich schon in meiner *system. Nomenclat. d. Sch. Inf.* geahndet.

MELOE TECTA. Fn. Inf. germ. X. 14.

Ist nur Abänderung von *Meloe Proscarabaeus* Linn. welche mit *Meloe punctata* Fab. et Fn. Inf. germ. X. 16. einerley ist. Die *Meloe Proscarabaeus* Fab. et Fn. X. 12. ist davon verschieden, und ist *Meloe violac.* Marsham. Illiger.

STAPHYLINUS CHLOROPTERUS. Faun. Inf. germ. XXXVI. 20.

*Staphylinus chloropterus.* Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 5. p. 591.

*Staphylinus chloropterus.* Gravenh. coleopt. micropt. n. 15. p. 166.

STAPHYLINUS AENEOCEPHALUS. Fn. Inf. germ. XXVII. 5.

*Staphylinus chalconcephalus.* Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 17. p. 593.

STAPHYLINUS FVLVIPES. Fn. Inf. germ. XXVII. 9.

*Staphylinus ochraceus.* Gravenhorst. coleopt. micropt. n. 65. p. 43.

STA-

- STAPHYLINUS FUSCIPES. Fn. Inf. germ. XXVII. 12.  
*Tachinus sordidus*. Gravenh. coleopt. micropt.  
n. 8. p. 141.
- STAPHYLINUS ANGVSTATVS. Fn. Inf. germ. XI. 18.  
(non 34. 18, ut apud Fabric. Syst. Eleuth.)  
*Staphylinus angustatus*. Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 50. p. 599.  
*Pæderus angustatus*. Gravenh. coleopt. mi-  
cropt. n. 7. p. 63.
- STAPHYLINUS SANGVINEVS. Fn. Inf. germ. XI. 19.  
*Pselaphus sanguineus*. Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 22. p. 293.
- STAPHYLINUS BIGUTTATVS. Fn. Inf. germ. XI. 17.  
*Stenus biguttatus*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 1.  
p. 602.  
*Stenus biguttatus*. Gravenh. coleopt. micropt.  
n. 2. p. 154.
- STAPHYLINUS CLAVICORNIS. Fn. Inf. germ. XXVII.  
11.  
*Stenus bupthalmus*. Gravenh. coleopt. mi-  
cropt. n. 6. p. 156.
- STAPHYLINUS FLORALIS. Fn. Inf. germ. XI. 20.  
*Stenus floralis*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 6.  
p. 604.  
*Omalium florale*. Gravenh. coleopt. micropt.  
n. 10. p. 118.

STAPHYLINUS PALLIDIPENNIS. Fn. Inf. germ. XXVII. 16.

*Oxytelus morsitans*. Gravenh. coleopt. micropt. n. 9. p. 108.

STAPHYLINUS CARINATUS. Fn. Inf. germ. LVII. 24.

*Oxytelus carinatus*. Gravenh. coleopt. micropt. n. 6. p. 106.

STAPHYLINUS ARMATUS. Fn. Inf. germ. LXVI. 17. Mas.

*Oxytelus tricornis*. Gravenh. coleopt. micropt. n. 11. p. 109.

STAPHYLINUS IMPRESSUS. Fn. Inf. germ. XXXVI. 21.

*Staphylinus impressus*. Gravenh. coleopt. micropt. n. 51. p. 35.

STAPHYLINUS LAMINATUS. Fn. Inf. germ. LXVII. 20.

*Staphylinus laminatus*. Gravenh. coleoph. micropt. n. 17. p. 16.

*Staphylinus laminatus*. Creutz. Verf. p. 128. tab. 3. fig. 31.

OXYPORUS LUNULATUS. Fn. Inf. germ. XXII. 15.

*Staphylinus atricapillus*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 49. p. 599.

*Tachinus atricapillus*. Gravenh. coleoptr. micropt. n. 19. p. 148.

OXY-

OXYPORVS MARGINELLVS. Fn. Inf. germ. IX. 13.

*Tachinus humeralis*. Gravenh. coleopt. micropt. n. 2. p. 136.

OXYPORVS MERDARIVS. Fn. Inf. germ. XXVII. 18.

*Staphylinus merdarius*. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 46. p. 598.

PAEDERVS ELONGATVS. Fn. Inf. germ. IX. 12.

*Paederus elongatus*. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 3. p. 609.

*Lathrobium elongatum*. Gravenh. coleopt. micropt. n. 8. p. 55.

PAEDERVS FVLVIPENNIS. Fn. Inf. germ. XXVII. 23.

*Staphylin. ochrac. Var.* Gravenh. coleopt. micropt. n. 65. p. 43.

PAEDERVS FVLGIDVS. Fn. Inf. germ. XLIII. 20.

*Staphylinus fulminans*. Gravenh. coleopt. micropt. n. 70. p. 47.

Nach Herrn D. Gravenhorst a. a. O. nicht der *Paederus fulgidus Fabric.*

PAEDERVS ORBICVLATVS. Fn. Inf. germ. XLIII. 21.

*Paederus orbicularis*. Gravenh. coleopt. micropt. n. 6. p. 63.

Nicht der *Paederus orbiculatus Fabric.* sondern *Paeder. orbicul. Payk.* Der eigentliche *Paederus orbicul. Fabric.* wird von Herrn D. Gravenhorst a. a. O. mit *Lathrobium fracticorne* n. 5. p. 54. vereinigt.

PAEDERUS DIMIDIATUS. Fn. Inf. germ. XXVII. 24.


*Staphylinus tenuis*, Fabric. Syst. Eleuth. II.  
n. 53. p. 599.


*Staphylinus tenuis*. Gravenh. coleopt. micropt.  
n. 58. p. 39.

---

CLAVIGER TESTACEUS. Fn. Inf. germ. XLIX. 9.


Die Gattung *Claviger* ist sehr ausgezeichnet, und auffallend. Ich zweifle nicht daran, daß der *Clavig. testaceus* ein ausgebildetes Insekt seye. In der Kopfbildung ist er dem *Sarrotrium* sehr ähnlich. Ich habe wohl ein Duzend sich völlig gleicher Exemplare dieser merkwürdigen Preyslerischen Entdeckung vor mir gehabt. Die Leibringe sind allerdings vorhanden, aber in der Aftergegend, welche nach unten abfällt, zu suchen. Illiger.















SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00356341 8

Number QL482 G2P19

Bdchn. Kritische Revision der Insektenfa